

Kinder-MDL

Adalimumab toedienen bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa; informatie voor kinderen en jongeren

Je dokter en/of IBD verpleegkundig(e) (specialist) heeft met je gesproken over het gebruik van Adalimumab. In deze folder lees je de belangrijkste zaken over dit medicijn. Namelijk de werking, maar ook hoe je dit medicijn het beste kunt gebruiken. Elke medicijn heeft naast de werking ook altijd kans op bijwerkingen. In deze folder lees je hoe je om kunt gaan met deze mogelijke bijwerkingen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter die je bij de apotheek krijgt. Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan je daarmee terecht bij je dokter of IBD verpleegkundig(e) (specialist).

Algemeen

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is tot nu toe niet bekend. Daarom is de behandeling met medicijnen gericht op het verminderen van klachten en het voorkomen van verslechtering van je ziekte. Medicijnen kunnen gegeven worden om de ziekte rustig te maken (vaak een korte behandeling) maar ook om de ziekte rustig te houden (onderhoudsbehandeling voor jaren). Daardoor kan het zijn dat je verschillende medicijnen tegelijk moet gebruiken. De ziekte geneest dus niet door de behandeling met medicijnen. Na het minderen of stoppen met (onderhouds-)medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Uitleg voor degene die de prik zet

Spullen die je nodig hebt:

- Medicatieoverzicht
- Met adalimumab gevulde spuit
- Injectienaald
- Pleister
- Naaldencontainer
- Afvalzakje

Medicatieoverzicht

[illegible]

Prikken met pen of spuit

 Prikken met voor gevulde pen	 Prikken met een spuit
• Controleer in het venster of er heldere vloeistof in de spuit zit. • Verwijder de grijze dop (met nummer '1' erop) van de spuit en daarna de donkerroze dop (met nummer '2' erop) • Fixeer met je ene hand de prikplaats tussen duim en wijsvinger. • Plaats het witte uiteinde (naald) loodrecht in de huid in een hoek van 90 graden. • Druk licht het witte uiteinde op de huid. • Duw met je wijsvinger of duim op de donkerroze knop als je klaar bent voor de prik. Je hoort dan een duidelijke 'klik' en voelt een klein prikje. • Blijf gedurende 10 seconden duwen om ervoor te zorgen dat alle medicijnen in je lichaam terecht komt. • Neem na die 10 seconden de voorgevulde pen rechtop van zijn plek. • Druk met een gaasje gedurende 10 seconden zachtjes op de plek waar je geprikt hebt om eventueel het bloeden te stoppen. Probeer niet te wrijven. Plak er zo nodig een pleister op. • Laat de Humira-pen in één geheel in de naaldencontainer vallen. • Doe al het overige afval in een afvalzakje. Deze mag in uw gewone huisvuilniszak. • Was je handen. • Teken de gegeven injectie af op het medicatieoverzicht.	• Verwijder het dopje van de spuit en zet de naald op de spuit. • Verwijder de beschermhuls van de naald en houd de spuit als een pen in je hand • Fixeer met je andere hand de prikplaats tussen duim en wijsvinger. • Plaats nu de naald loodrecht in de huid in een hoek van 90 graden. • Trek met de hand die eerder de huid fixeerd, de zuiger van de spuit iets omhoog en kijk of er bloed in de spuit komt. Is dit het geval verwijder dan de spuit, druk de prikplaats af en begin opnieuw met een nieuwe spuit en naald. • Spuit vervolgens de vloeistof in door de zuiger rustig naar beneden te drukken. • Leg een gaasje op de prikplaats en verwijder de naald, in één beweging, uit de huid • De prikplaats niet masseren. • Laat spuit en naald in één geheel in de naaldencontainer vallen. • Druk de prikplaats af met het gaasje en plak er zo nodig een pleister op. • Doe al het overige afval in een afvalzakje. Deze mag in uw gewone huisvuilniszak. • Was je handen. • Teken de gegeven injectie af op het medicatieoverzicht.

Aanvullende informatie

Injectiemoment

Kies een vaste dag en tijdstip waarop je de prik zet, zodat je het niet vergeet.

Knoeien

Wanneer er vloeistof uit de spuit wordt geknoeid op bijvoorbeeld meubilair of tapijt dan kan je de vloeistof opnemen met een tissue en daarna het oppervlak met water reinigen. Komt de vloeistof in aanraking met kleding, dan kan je deze het beste direct wassen in de wasmachine. Bij contact met de huid en/of ogen moet je 10 à 15 minuten grondig spoelen met water en hierna contact opnemen met je huisarts.

Naaldencontainer

Direct na het prikken doe je de spuit met naald in de naaldencontainer. Deze mag niet bij het huisafval, maar wordt vol ingeleverd bij de apotheek.

Overig afval

Al het overige afval mag in de normale huisvuilniszak.

Voorraad

Controleer regelmatig de voorraad spuiten, neem zo nodig contact op met de apotheek of met je dokter voor een herhaalrecept. Let op: Adalimumab altijd gekoeld bewaren!

Prikaccident

Het is mogelijk dat als iemand anders jou prikt, zich per ongeluk prikt aan de naald tijdens het prikken of opruimen van de adalimumab. Laat in dat geval het wondje goed uitbloeden, door vlak naast de wond te drukken. Dit om eventuele adalimumab te verwijderen. Spoel het wondje met lauw kraanwater uit. Neem vervolgens contact op met de polikliniek of je huisarts.

Adviezen bij prikangst

Prikken krijgen is natuurlijk nooit leuk, maar soms is het wel erg belangrijk. Adalimumab is niet verkrijgbaar in tabletten.

Hierbij een aantal tips om het prikken misschien wat makkelijker te maken:

- Zorg dat je goed voorbereid bent op de prik. Begrijp waarom je de prik moet krijgen. Een prik doet altijd een beetje pijn, maar gelukkig is dit altijd pijn die maar een klein moment duurt.
- Als je prikken veel pijn vindt doen, kan je proberen of het minder pijn doet als je de plek van prikken een beetje koud maakt met ijsklontjes. Mocht dit niet genoeg helpen kan je vragen aan je dokter/verpleegkundig(e) (specialist) of ze misschien een verdovende zalf (EMLA) willen regelen. Hierdoor voel je de prik niet zo goed meer. Het inspuiten van het medicijn voel je nog wel.
- Probeer tijdens het prikken aan iets anders te denken. Denk bijvoorbeeld aan wat je het allerliefste voor je verjaardag wilt hebben of wat je graag wil gaan doen als je vakantie hebt. Dan zal je merken dat het prikken veel sneller gaat.

Werkwijze

- Zorg voor een rustige omgeving
- Controleer op het medicatieoverzicht de datum van injecteren
- Haal de adalimumab uit de koelkast
- Controleer de houdbaarheidsdatum en de dosering
- Was je handen

- Bepaal de prikplaats (bij voorkeur in het bovenbeen of links en rechts onder in de buik)



Heb je nog vragen?

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, neem dan contact op met je behandelend specialist of IBD-verpleegkundige.

Kinderpolikliniek MDL (maag-darm-lever), wachtkamer 3, telefoon: 020-5660300

Bij problemen buiten kantoortijden en in het weekend kan je bellen naar Amsterdam UMC: telefoon: 020-5669111. Vraag dan naar de dienstdoende kinderarts.