

Kinder MDL

Vedolizumab (Entyvio®) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa; informatie voor kinderen en jongeren

Je arts en/of IBD-verpleegkundig(e) (specialist) heeft met je gesproken over vedolizumab (Entyvio®). In deze folder lees je de belangrijkste zaken over dit medicijn: de werking, gebruik, bijwerkingen en praktische adviezen. Deze folder is géén vervanging van de bijsluiter. Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, dan kan je daarmee altijd terecht bij je behandelend arts of IBD-verpleegkundig(e) (specialist).

Algemeen

De oorzaak van Crohn en colitis ulcerosa is nog niet bekend. Behandelingen met medicijnen zijn bedoeld om:

- ontstekingen te verminderen;
- klachten onder controle te houden;
- opvlammingen en complicaties te voorkomen.

De ziekte geneest niet door medicijnen. Als de behandeling gestopt wordt, kunnen klachten weer terugkomen.

Werking

Vedolizumab is een (zogenaamd biologisch) medicijn tegen de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Het richt zich speciaal op de darmen (gut-selectief) en remt het ontstekingseiwit integrine $\alpha 4\beta 7$. Daardoor kunnen ontstekingscellen minder makkelijk in de darmwand komen en verminderen klachten zoals buikpijn, diarree en vermoeidheid. Het effect merk je soms pas na enkele weken tot ± 14 weken.

Voorzorgsmaatregelen vóór de start

- Je wordt getest op TBC (tuberculose)

Vertel het altijd als je:

- koorts of een infectie hebt (bijv. wond, griep, hoesten);
- terugkerende infecties hebt;
- hart- of neurologische problemen hebt;
- andere medicijnen gebruikt (neem een lijstje mee).

Toediening

- Via een infuus of subcutaan (net onder de huid).
- Schema: week 0, 2 en 6 en meestal daarna elke 8 weken, paar dit kan ook meer frequent zijn.

Bij ziekte

Krijg je koorts, hoesten, diarree of een andere infectie? Bel je behandelteam meestal wordt de gift tijdelijk uitgesteld tot je beter bent.

Bijwerkingen

Meest voorkomend: Verkoudheid/griep, hoofdpijn, gewrichtspijn.

Vaak: Misselijkheid, hoge bloeddruk, huiduitslag, spierzwakte, reactie rond het infuus.

☞ Bel je arts/verpleegkundige bij: hoge koorts, benauwdheid, heftige huiduitslag, aanhoudend ziek gevoel, of als je je ongerust maakt.

Controles

- Regelmatig bloed- en ontlastingsonderzoek
- Poli-afspraken bij arts of IBD-verpleegkundig(e) (specialist).
- Soms extra onderzoek, zoals endoscopie of MRI.

Vaccinaties

- Levende vaccins (zoals BMR, waterpokken/varicella, BCG, gele koorts) niet nemen tijdens vedolizumab.
- Overige vaccinaties en de jaarlijkse griep prik wordt wél aangeraden.

Bij vragen over vaccinaties, neem contact op met je arts en of IBD-verpleegkundig(e) (specialist). Zo nodig kan je verwezen worden naar de vaccinatiepolikliniek.

Contact

Heb je vragen of maak je je zorgen? Neem contact op met je behandelteam.

Kinder-MDL polikliniek Emma Kinderziekenhuis - 020-566 03 00

Avond/weekend: dienstdoende kinderarts via 020-566 91 11