

Kinderendocrinologie

Groeihormoonstimulatietest (clonidine test) voor kinderen: informatie voor ouders

Binnenkort wordt uw kind opgenomen in verband met een groeihormoonstimulatietest (clonidine test) op de Emma dagbehandeling van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze brief bevat belangrijke informatie over de opname. De afspraken over datum, tijdstip en locatie van opname krijgt u telefonisch of per brief.

Locatie: Emma dagbehandeling (F8-zuid)

De Emma dagbehandeling bevindt zich op locatie AMC: in bouwdeel F op de 8^e verdieping, locatie F8-zuid. Bij de portier bij de ingang kunt u een routekaartje vragen.

Doel van de clonidine test

De clonidine test is een groeihormoonstimulatietest die wordt gedaan om te bekijken of uw kind een groeihormoontekort heeft.

Korte uitleg over clonidine

Clonidine is een eiwit en stimuleert de hypofyse (een klier in de hersenen) tot het afgeven van het groeihormoon. Door het toedienen van deze stof via een infuus wordt de hypofyse 'expres' aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra groeihormoon. Dit groeihormoon kan gemeten worden in het bloed. Op deze manier kunnen wij zien hoeveel groeihormoon de hypofyse kan maken als deze daartoe gestimuleerd wordt, en of dit afwijkend is.

Vorbereiding

Voor deze test moet uw kind nuchter zijn (een lege maag hebben).

Uw kind is jonger dan 3 maanden: Geef uw kind om 3:00 uur 's nachts een laatste voeding, ook als er geen nachtvoeding meer wordt gegeven. Daarna nuchter houden.

Uw kind is ouder dan 3 maanden, maar jonger dan 12 maanden: Geef uw kind om 24:00 uur 's avonds een laatste voeding. Daarna nuchter houden.

Uw kind is ouder dan 12 maanden: Houdt uw kind nuchter vanaf 22:00 uur 's avonds.

Vanaf het moment van nuchter zijn mag uw kind wel water en thee zonder suiker. Uw kind mag geen limonade, melk of iets dergelijks drinken.

Omdat uw kind nuchter moet blijven tijdens de test beginnen we zo vroeg mogelijk. Het is daarom belangrijk dat u op de afgesproken tijd op de afdeling bent.

Verdovende crème (Emla)

Als u van de arts een recept hebt gehad voor verdovende crème (Emla), brengt u deze de ochtend van de test uiterlijk 8:00 uur aan bij uw kind (inwerktijd is minimaal 1 uur). Dit is een crème die

de huid verdoofd waardoor het de pijn van de prik verzacht. Knijp de crème direct uit de tube op de aderen (blauwe lijnen) in de elleboogplooï en op de handruggen van uw kind. Smeer de crème niet uit maar dek hem af met de bijbehorende pleister of eventueel transparante huishoudfolie als uw kind geen pleisters verdraagt. Laat de crème zitten, de verpleegkundige zal het verwijderen voordat het infuus wordt ingebracht.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken. De medicijnen mogen alleen met water of thee **zonder** suiker worden ingenomen.

Ziekte

Neem zo spoedig mogelijk contact op met de Emma dagbehandeling via 020-5665857 indien uw kind in de dagen voorafgaande aan de test:

- ziek is geworden;
- in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft zoals waterpokken, rode hond, bof, mazelen of kinkhoest.

Dit kan betekenen dat we de test moeten uitstellen.

Als uw kind koorts heeft hoger dan 38 °C kan de test niet doorgaan. De test wordt uitgesteld tot uw kind koortsvrij is. Ook als uw kind verkouden is kan de test worden uitgesteld.

Werkwijze

Bij binnenkomst krijgt uw kind een bed op de afdeling. Voor en tijdens de test worden regelmatig controles uitgevoerd waaronder temperatuur, bloeddruk, hartactie en bloedsuikerwaarde. De verpleegkundige brengt in de behandelkamer een infuus in bij uw kind. Uit dit infuus nemen we gedurende de test het bloed af. Terug op bed wordt er opnieuw bloed afgenomen en krijgt uw kind de clonidine-oplossing via de mond met een slokje water. Er wordt daarna iedere 15-30 minuten bloed afgenomen uit het infuus.

Zolang de test bezig is moet uw kind nuchter blijven. U kind mag wel water en thee **zonder** suiker drinken. Verder is het de bedoeling dat uw kind bedrust houdt. Uw kind kan wel naar het toilet. De totale opname duur bedraagt ongeveer 3 uur. Wanneer de test klaar is, uw kind zich goed voelt, wat gegeten heeft en de bloedsuiker in orde is, zal het infuus worden verwijderd en mag uw kind met ontslag. Er is na de test een broodmaaltijd voor uw kind op de afdeling.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van de clonidine kunnen zijn een lagere bloeddruk en vermoeidheid.

Tijdens de test wordt (ook via het infuus) regelmatig de bloedsuikerwaarde gecontroleerd. Dit in verband met het nuchter zijn van uw kind.

Ontslag

Voor het bespreken van de uitslag van de test krijgt u een (telefonische) afspraak met uw behandelend arts. Er zijn geen problemen te verwachten na ontslag. Mochten zich toch problemen voordoen na de test of voor vragen vooraf, kunt u contact opnemen met de Emma dagbehandeling. We zijn bereikbaar via 020-5665857 van maandag tot en met vrijdag van 8:45 uur tot 15:00 uur. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met het AmsterdamUMC, locatie AMC via telefoonnummer 020-5669111 en vragen naar de dienstdoende kinderarts.