

Röntgenonderzoek van de plasbuis

Deze tekst informeert u over het röntgenonderzoek van de plasbuis. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde arts (de radioloog) geassisteerd door een laborant.

Röntgenonderzoek van de plasbuis, wat is dat?

Een röntgenonderzoek van de plasbuis is een onderzoek van de urinebuis (plasbuis), waarbij gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof. Sommige delen van het lichaam, zoals de botten, zijn zichtbaar op een röntgenfoto. Andere delen, zoals de urinewegen, zijn op een röntgenfoto alleen zichtbaar te maken door gebruik te maken van een röntgencontrastmiddel. Dit contrast bevat jodium.

Het onderzoek

U hoeft zich niet voor te bereiden op het onderzoek. Een laborant haalt u uit de wachtkamer en vertelt u wat er gaat gebeuren. U neemt plaats op de röntgentafel.

Nadat de radioloog zich aan u heeft voorgesteld, worden wat voorbereidingen getroffen om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

De voorhuid wordt naar achter geschoven en de penis wordt schoongemaakt. U draait uzelf een klein beetje op uw rechterzijde. Vervolgens wordt de penis met een speciale klem of een gaasje gestrekt. Via de opening van de urinebuis wordt met een smal plastic buisje waterig contrastmiddel ingespoten. Dit kan een beetje gevoelig zijn. Het buisje wordt niet verder dan 0.5-1 cm in de urinebuis geplaatst. Tegelijkertijd met het inspuiten worden meerdere foto's gemaakt. Hierna is het klaar en worden de klem en het inspuitsbuisje verwijderd. Het contrastmiddel kan er weer uitlopen. Het hele onderzoek duurt 15-20 minuten.

N.B. het gebruikte contrast voelt plakkerig aan. Dit kan na afloop van het onderzoek nog een beetje lekken uit de urinebuis. Verder moet u er rekening mee houden dat er ook een beetje bloed uit de urinebuis kan komen. Dit zal na een paar keer plassen verdwijnen/stoppen. Daarom raden wij u aan veel te drinken.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de opnames na afloop van het onderzoek en maakt hiervan een verslag. Voor de uitslag kunt u een afspraak maken bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Verhinderings

Neem wanneer u verhinderd bent (telefonisch) contact op met de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt onderzoeken.

Contrastvloeistof en overgevoeligheid

Het röntgencontrastmiddel kan een enkele maal tot een overgevoeligheidsreactie leiden. Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof of jodiumhoudende stoffen, dan moet u dit ruim van te voren melden aan het afsprakenbureau. Er zal dan overlegd worden met de radioloog over de juiste uitvoering van het onderzoek.

Belangrijk!

Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen meld dit dan vóór het onderzoek aan de laborant.

Tot slot

Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over het onderzoek. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie, telefoon: 020-444 4200 (tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 uur). Vergeet niet uw patiëntenpas van Amsterdam UMC mee te nemen naar het onderzoek samen met een geldig identiteitsbewijs.