

Angioseal

U heeft een ingreep ondergaan waarbij een bloedvat in uw hersenen is behandeld. Daarvoor is een slagader in uw lies aangeprikt en zijn er katheters via uw liesslagader naar de aangedane plek in het bloedvat in uw hersenen gebracht. Nadat de behandeling klaar was en de katheters verwijderd zijn, is er een zogenaamde “angioseal” ingebracht om de aanprikplaats te sluiten.


Bij welke aandoeningen wordt een angioseal geplaatst?

- Bij een herseninfarct
Er is geprobeerd het stolsel in het bloedvat in uw hersenen weg te halen.
- Bij een Sub Arachnoïdale Bloeding (SAB)
Het aneurysma is opgevuld met platina spiraaltjes (coils).
- Bij een Arterio Veneuze Malformatie (AVM)
De AVM is dichtgeplakt met lijm en/of opgevuld met platina spiraaltjes (coils).

Wat is een angioseal?

Een angioseal is een soort plug die ervoor zorgt dat het aanprikgaatje van de slagader in de lies wordt afgesloten.

Als er een angioseal is geplaatst krijgt u een patiëntenkaartje mee. Op dit kaartje staat dat er een angioseal bij u is aangebracht en dat u de eerste 3 maanden bij voorkeur niet in deze lies mag worden geprikt. Het duurt namelijk 3 maanden voordat de angioseal is opgelost.



Figuur 1: afbeelding van een Angio-seal

Activiteiten na de behandeling

- U heeft 6 uur platte bedrust. Het been waarin de angioseal zit moet u gestrekt houden.
- U dient tijdens hoesten, niezen en persen met de hand een lichte druk uit te oefenen op de punctieplaats.
- U mag na de voorgeschreven bedrust mobiliseren. Probeer de eerste twee dagen rustig aan te doen en het been waarin de angioseal geplaatst is te ontzien (met name bij traplopen en bij opstaan uit zittende positie).

De verpleegkundige controleert de lies regelmatig op bloeding, zwelling en roodheid.

Wat is normaal?

- Dat u een kleine bobbel ter grootte van een erwt voelt en/of lichte pijn heeft in de liesstreek.
- Blauwe plekken of enig ongemak zijn normaal tijdens het genezingsproces.

Leefregels na een angioseal behandeling

- Op de dag van behandeling mag u niet autorijden.
- De eerste 3-4 dagen na behandeling is het verstandig om geen druk verhogende activiteiten uit te voeren, vanwege kans op nabloeding. Dus niet persen, niet zwaarder tillen dan 5 kg en bij voorkeur met open mond niezen.
- Tot het wondje goed gesloten is mag u alleen douchen, dus niet in (zwem)bad of sauna.
- Zodra het wondje droog is mag de pleister af.
- Het patiëntenkaartje moet u gedurende 3 maanden altijd bij u dragen. Het is aan te raden dat uw contactpersoon hiervan op de hoogte is.

Contact opnemen met de afdeling

Na ontslag graag contact opnemen met de afdeling als:

- u koorts heeft (38 °C of hoger);
- de lies erg gevoelig of pijnlijk is;
- de zwelling in de lies toeneemt in de loop van de tijd;
- de lies rood wordt en warm aanvoelt;
- uw been gevoelloos is of pijnlijk aanvoelt;
- u huiduitslag krijgt;
- de insteekopening in de lies wederom gaat (na)bloeden; als de insteekopening een klein beetje vocht produceert is dat niet erg.

Neem bij twijfel gerust contact op met de afdeling.