

## Kinderallergologie

# Acarizax; informatie voor ouders en kind

### Wat is Acarizax?

Acarizax is een medicijn dat helpt bij allergie voor huisstofmijt. Het zorgt ervoor dat het lichaam langzaam went aan huisstofmijt, zodat uw kind minder klachten krijgt. U kunt Acarizax alleen op recept krijgen.

### Waarvoor wordt Acarizax gebruikt?

Acarizax wordt gebruikt bij kinderen die allergisch zijn voor huisstofmijt. Klachten kunnen zijn:

- Niesbuien, een loopneus of verstopte neus
- Jeukende, branderige of tranende ogen
- Jeuk of uitslag op de huid
- Benauwdheid of een astma-aanval

Het doel van Acarizax is dat deze klachten minder worden of verdwijnen.

### Hoe gebruikt uw kind Acarizax?

- Uw kind neemt elke dag 1 tablet.
- De tablet moet met droge vingers onder de tong worden gelegd.
- Laat de tablet minstens 1 minuut onder de tong smelten.
- Uw kind mag de eerste 5 minuten na het innemen niet eten of drinken.
- Probeer de tablet elke dag op hetzelfde moment te geven, bijvoorbeeld met een alarm op uw telefoon.
- Als uw kind de tablet meer dan een week niet heeft genomen, neem dan contact op met de arts.
- De tablet moet onder de tong smelten en niet doorgeslikt worden. Als de tablet wordt doorgeslikt, werkt het medicijn niet goed.

### Wanneer moet u extra opletten?

Neem contact op met de arts als:

- Uw kind eerder een erge allergische reactie heeft gehad op een injectie met huisstofmijt.
- Uw kind allergisch is voor vis (Acarizax kan sporen van vis bevatten, maar het risico op een reactie is klein).
- Uw kind ernstige allergische klachten krijgt, zoals moeite met slikken of ademen, een vol gevoel in de keel, of een lage bloeddruk. Stop dan direct met het medicijn en bel de arts.
- De astmaklachten van uw kind erger worden. Stop dan direct met het medicijn en bel de arts.

- Uw kind last krijgt van brandend maagzuur of moeite met slikken die niet overgaat. Stop dan met het medicijn en neem contact op met de arts.

### **Wat als u een dosis vergeet?**

- Geef de tablet later op de dag alsnog.
- Geef nooit twee tabletten op één dag.
- Als uw kind het medicijn meer dan 7 dagen niet heeft genomen, neem dan contact op met de arts.

### **Hoe lang duurt de behandeling?**

- De behandeling duurt 3 tot 5 jaar.
- Uw kind moet het medicijn minimaal 3 jaar achter elkaar gebruiken.
- Elk jaar komt u met uw kind op controle bij de arts.
- Als er na 1 jaar geen verbetering is, bespreekt de arts of het zinvol is om door te gaan.

### **Mag uw kind andere medicijnen blijven gebruiken?**

Ja, uw kind mag de andere medicijnen tegen allergie blijven gebruiken, zoals antihistaminica of pufjes voor neus en longen. Vooral in het eerste jaar is dit belangrijk.

### **Wat als uw kind tanden wisselt, tand getrokken moet worden?**

Als uw kind tanden wisselt, stop dan 7 dagen met Acarizax. Neem contact op met de arts.

Als er een tand of kies getrokken moet worden of uw kind heeft wondjes in de mond, moet Acarizax tijdelijk gestopt worden totdat de mond is genezen.

### **Mogelijke bijwerkingen**

Uw kind kan bijwerkingen krijgen, vooral in het begin. Meestal gaan deze klachten na 1 tot 3 maanden over.

**Stop direct** met het medicijn en bel de arts als uw kind:

- Meer last krijgt van astma
- Plotselinge zwelling krijgt van gezicht, mond, keel of huid
- Moeite krijgt met slikken of ademen
- Een vol gevoel in de keel krijgt
- Huiduitslag met jeuk en bultjes krijgt

Andere veel voorkomende bijwerkingen zijn:

- Gevoel van irritatie of jeuk in de mond of keel
- Zwelling van mond of lippen
- Jeukende oren
- Ontstoken luchtwegen
- Prikkend gevoel of gevoelloosheid in de mond of tong
- Jeukende ogen, tong of lippen
- Opzwellen van tong of keel
- Pijn of branderig gevoel in de mond
- Veranderd smaakgevoel

- Buikpijn, diarree, misselijkheid of overgeven
- Hoesten, benauwdheid, pijn op de borst
- Vermoeidheid

## Heeft u vragen?

Mail naar: [allergiekinderen@amsterdamumc.nl](mailto:allergiekinderen@amsterdamumc.nl)

