

(Laten) innemen van een drank met cytostatica; informatie voor de patiënt en betrokkenen

Deze tekst geeft informatie over het veilig (laten) innemen van een drank met cytostatica.

Het (laten) innemen van een drank

Indien een deel van een tablet of capsule ingenomen moet worden, dan wordt dit in de vorm van een drank in een spuitje door de apotheek afgeleverd.

Benodigheden

- handschoenen;
- spuitje met cytostatica;
- glas water;
- afvalzak.

Algemeen: het gebruik van handschoenen

Denk eraan wanneer u handschoenen gebruikt dat u zo weinig mogelijk dingen vastpakt. Denk bijvoorbeeld aan deurknoppen, telefoon, de wasmachine, maar ook de verpakking van de medicijnen zelf. Advies is om aangeraakte materialen later af te nemen met een zeepoplossing. Als er cytostaticavloeistof geknoeid wordt dit zo snel mogelijk opnemen met een tissue en daarna de plaats afnemen met een zeepoplossing.

Uitvoering

Handeling	Toelichting
Was en droog uw handen	
Trek handschoenen aan	
Pak de spuit met cytostaticum	
Overtuig u ervan dat u het juiste medicijn neemt/geeft, op het juiste moment en op de juiste manier	
Spuut de inhoud rechtstreeks in de wangzak (van de patiënt)	Neem/geef een glas water, zodat de medicatie met het water doorgeslikt kan worden
Deponeer al het afval in de afvalzak	

Trek handschoenen uit en deponeer deze in de afvalzak	De handschoenen worden onmiddellijk uitgedaan na de handeling om besmetting van de omgeving te voorkomen
Was en droog uw handen	
Neem/geef de patiënt voldoende te drinken (1,5 liter per dag, tenzij anders is voorgeschreven)	Braakt u/de patiënt binnen twee uur, dan contact opnemen met de arts voor overleg of het medicijn opnieuw ingenomen moet worden

Contact opnemen

Als er problemen zijn met het laten innemen van een drank, belt u dan het ziekenhuis voor overleg:

- Volwassen afdeling oncologie (kantooruren) telefoonnummer 020 444 05 22