

Littekencorrectie en bestralen

Bestraling remt delende cellen. De delende cellen zijn bloedvaatcellen en bindweefsel-producerende-cellen. Wanneer daar minder van zijn is de kans groot dat het litteken niet terug groeit. De behandeling bestaat uit 2 fases. Fase 1: Het verwijderen van littekenweefsel. Fase 2: Bestraling aansluitend aan de operatie.

Risico's

Bestraling kan kankerverwekkend zijn, maar bij deze vorm van bestraling is dit risico zeer klein. Daarbij is het afhankelijk van de plek waar het litteken zich bevindt en waar dus de straling komt rondom de katheter. De bestraling kan ertoe leiden dat de wond minder goed geneest.

Het is mogelijk dat door de bestraling de wond niet optimaal geneest. U doet er dan goed aan deze eens per dag af te spoelen onder de douche en er een vet en droog gaasje op aan te brengen. Ook is het mogelijk dat er een infectie van de wond optreedt, ook al komt dit zelden voor. Wordt de wond rood, dik en pijnlijk, dan dient u contact op te nemen met de poli Plastische chirurgie. Het kan dan nodig zijn om antibiotica voor te schrijven.

Door de bestraling kan het wondgebied zelf en om het litteken heen langduriger rood blijven, of meer of minder pigment laten zien. Zeker als u een donkere huid heeft kan dit opvallend zijn. Vaak trekt dit in de loop van het jaar weg. We houden dit in de gaten bij de controles na de ingreep.

Behandeling

Op de afdeling Radiotherapie worden de bestralingen uitgevoerd. Als eerste zal een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de bestralingsarts waarin de behandelprocedure, stralingsbelasting en mogelijke risico's en complicaties worden besproken. Daarna wordt u ingepland voor behandeling bij de poli Plastische chirurgie en afdeling Radiotherapie.

Dag van de behandeling

Als eerste wordt op de Scar Clinic, poli Plastische chirurgie, onder lokale verdoving het gehele litteken, of een groot deel van het littekenweefsel, chirurgisch verwijderd. Hierna wordt een dunne katheter (kunststofbuisje) ingebracht in het litteken en met hechtingen gefixeerd. Deze katheter komt aan weerszijde van de wond via een klein gaatje naar buiten. Dit is nodig voor de bestraling, welke via de katheter wordt toegediend.

Na uw behandeling bij de Scar Clinic gaat u naar de afdeling Radiotherapie. Hier wordt de bestraling uitgevoerd. Twee radiotherapeutisch laboranten voeren de behandeling uit in samenwerking met een bestralingsarts. Zij sluiten de katheter aan op het bestralingsapparaat. Tijdens de bestraling zijn zij niet bij u in de ruimte aanwezig. Tijdens de bestraling gaat een bestralingsbron stapsgewijs door de katheter. Van de bestraling voelt u helemaal niets. De bestraling duurt meestal een paar minuten. U moet tijdens de bestraling rustig blijven liggen.

Na de bestraling kunt u gewoon naar huis.

Nazorg en vervolgspraken

Wij zien u terug ter controle op de Scar Clinic 6 weken na de laatste behandeling. De hechtingen waarmee het wondje gesloten is zijn meestal oplosbaar, een nieuw ziekenhuisbezoek is alleen nodig wanneer ze na 2 weken verwijderd moeten worden.