

Juxtacorticaal (periostaal) chondroom

Patiënteninformatie

Wat is het?

Een juxtacorticaal chondroom (ook wel periostaal chondroom) is een zeldzame, goedaardige kraakbeentumor. De tumor ontstaat op het oppervlak van het bot, net onder het botvlies, en zaait niet uit. Hij komt vooral voor bij mensen jonger dan 30 jaar, het meest in de kleine botjes van de hand of de voet en soms in de bovenarm of het bovenbeen.

Klachten

Vaak zijn er weinig of geen klachten en wordt de tumor bij toeval ontdekt. Mogelijke klachten zijn een langzaam groeiende, soms voelbare zwelling en milde pijn. In de vingers en tenen geeft de tumor wat vaker pijn.

Onderzoeken

Röntgenfoto en MRI-scan. Op indicatie een CT-scan om te beoordelen hoe het bot eronder is aangedaan. Soms is weefselonderzoek (biopsie) nodig.

Behandeling

Operatie waarbij de tumor in zijn geheel wordt verwijderd met een rand(je) gezond weefsel, samen met een dun laagje van het onderliggende bot. Dit verkleint de kans dat de tumor terugkomt. Een kwaadaardige verandering van deze tumor is niet beschreven.

Controles

Controles met röntgenfoto's, op indicatie aangevuld met een MRI-scan, om te zien of de tumor niet terugkomt.