

Etrasimod (Velsipity®) bij colitis ulcerosa

Uw behandelaar heeft met u gesproken over het gebruik van Etrasimod (Velsipity®) bij colitis ulcerosa. In deze folder krijgt u informatie over de werking en het gebruik van dit medicijn, en hoe u moet handelen in geval van bijwerkingen. Het is echter geen vervanging voor de bijsluiter. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee terecht bij uw behandelaar.

Algemeen

De oorzaak van colitis ulcerosa is niet bekend. De behandeling is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Dit leidt tot vermindering van klachten en verkleint de kans op complicaties die zich bij deze ziekte voor kunnen doen. Medicijnen kunnen de darmontstekingen onderdrukken, maar genezen de ziekte niet definitief. Na het afbouwen of stoppen met medicijnen kunnen de ontstekingen en daarmee de klachten weer terugkomen.

Werking

Uw behandelaar schrijft etrasimod voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen. Etrasimod beïnvloedt het afweersysteem van het lichaam. Normaal gesproken beschermt dit systeem ons tegen ziektes en schadelijke stoffen van buitenaf. Bij mensen met colitis ulcerosa is het afweersysteem te actief. Etrasimod remt deze overactieve afweer en is een zogenoemde sфingosine-1-fosfaat (S1P)-receptormodulator. Het bindt zich selectief aan een bepaalde schakel van een eiwit waarmee waardoor ontstekingscellen worden vastgehouden in de lymfeknopen en daardoor de darm niet meer bereiken. Hierdoor wordt de ontsteking in de darmen minder. Klachten zoals diarree en buikpijn nemen daardoor af. Veel patiënten voelen zich daardoor minder moe en kunnen beter meedoen aan het dagelijks leven.

Voorzorgsmaatregelen

Voordat u start met etrasimod is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten of te behandelen. Tuberculose is een infectie die soms jarenlang ongemerkt in de longen zit zonder dat u hier iets van merkt. Het gebruik van etrasimod kan ervoor zorgen dat een sluimerende tuberculose-infectie actief wordt. Daarom wordt u voor het starten met etrasimod op tuberculose onderzocht. Ook hepatitis B en -C worden meestal gecontroleerd, en soms ook hiv. Het is belangrijk dat u zelf let op algemene verschijnselen van infecties. Klachten die hierbij kunnen passen zijn:

- gezwollen lymfeklieren in bijvoorbeeld hals en liezen
- aanhoudend hoesten

- plotseling gewichtsverlies
- koorts.

Tot slot wordt ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt om eventuele hartritme- en geleidingsstoornissen uit te sluiten.

Gebruik

Etrasimod wordt als tablet ingenomen. De dosering is eenmaal per dag 1 tablet van 2 milligram.

Vergeten in te nemen?

Als u vergeten bent uw medicijnen in te nemen, kunt u ze later op dezelfde dag alsnog innemen. Als u het pas de volgende dag merkt, slaat u de vergeten dosis over. U gaat dan verder volgens uw normale schema. Neem nooit een dubbele dosis.

Bijwerkingen

In de bijsluiter die met de etrasimod geleverd wordt, staan alle beschreven bijwerkingen vermeld. Deze kunt u rustig nalezen. De meest voorkomende bijwerking van etrasimod zijn klachten van (bovenste luchtweg)infecties. Verder wordt gemeld:

- urineweginfecties
- herpes-infecties
- hoofdpijn
- lage hartslag of hoge bloeddruk
- afwijkende leverwaarden.

Allergische reacties komen maar zelden voor. Mocht u bijwerkingen ervaren of vermoeden, is het belangrijk contact op te nemen met uw behandelaar.

Belangrijk

Neem altijd contact op met uw behandelaar als u bijwerkingen ervaart, ook als u niet zeker weet of ze door het medicijn komen.

Zwangerschap

Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van etrasimod gedurende de zwangerschap en het zwanger worden. Overleg met uw behandelaar wanneer u een zwangerschapswens hebt of zwanger bent en etrasimod gebruikt.

Borstvoeding

Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar over het gebruik van etrasimod tijdens de borstvoeding. Overleg met uw behandelaar over het geven van borstvoeding tijdens etrasimod gebruik.

Vaccinaties

Vaccinaties kunnen minder effectief zijn wanneer u etrasimod gebruikt. Vaccinaties met een vaccin dat (verzwakte) levende virussen of bacteriën bevat, worden afgeraden bij het gebruik van etrasimod. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gele koorts-vaccinatie, tuberculose (BCG), bof,

mazelen, rode hond (BMR), rotavirus en sommige vaccinaties tegen varicella (waterpokken). Als een van deze vaccinaties noodzakelijk is, raadpleeg dan eerst uw behandelaar.

Grieprik

U komt in aanmerking voor de (gratis) grieprik, omdat u een iets verminderde afweer tegen infecties heeft. Hiervoor kunt u bij uw huisarts terecht. De grieprik biedt geen bescherming tegen alle griepsoorten.

In Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u voor vaccinaties terecht op de polikliniek van het Tropicentrum. Een verwijzing kunt u vragen aan uw behandelaar.

Wanneer contact opnemen?

Informeer uw behandelaar als u bijwerkingen ervaart van etrasimod of wanneer u nog vragen heeft na het lezen van deze folder.

Neem ook contact op met uw behandelaar als u een operatie of tandheelkundige ingreep moet ondergaan. Vertel het uw chirurg of tandarts die de ingreep uitvoert dat u een behandeling met etrasimod ondergaat.

Hoe krijgt u etrasimod in huis?

Verschillende dure medicijnen, zoals etrasimod, worden niet rechtstreeks vergoed vanuit de zorgverzekering. Amsterdam UMC is verantwoordelijk voor het verstrekken van het geneesmiddel en het begeleiden van de toediening. U dient uw etrasimod op te halen bij de poliklinische apotheek van het ziekenhuis, na uw bezoek aan uw behandelaar. Dit is belangrijk zodat kan worden gecontroleerd of het gebruik van etrasimod nog steeds noodzakelijk en veilig is op het moment dat u een nieuwe voorraad ophaalt.

Contact

Treden er thuis complicaties of problemen op, of heeft u vragen, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten. Buiten kantoor tijden neemt u contact op met uw huisarts of de Specialistische Spoed Opvang (SSO) van Amsterdam UMC, locatie VUmc

- telefoonnummer 020 444 36 36

Mijn Dossier

Mijn Dossier is een digitale omgeving waarin patiënten van Amsterdam UMC kunnen inloggen om hun medisch dossier, afspraken en uitslagen in te zien. Ook kunt u berichten sturen naar uw zorgverlener of een video-afspraken bijwonen via Mijn Dossier.

Meer informatie over Mijn Dossier vindt u op

- <http://mijndossier.amsterdamumc.nl>

Neem bij vragen of het gebruik van Mijn Dossier contact op met het Digipunt via

- telefoonnummer: 020 444 33 36 (op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)
- e-mail via digitpunt@amsterdamumc.nl

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw behandelaar via Mijn Dossier of de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten.

Contactgegevens

Polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten, locatie VUmc

- locatie: Receptie Q
- telefoonnummer: 020 444 1125 - op werkdagen 8.30 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
- e-mailadres: mdl@amsterdamumc.nl

Verpleegkundig specialist IBD

Bereikbaar via Mijn Dossier

- schrijf uw bericht aan: P Vumc Mdl Ibd Verpleegkundig Specialististen

Spoed-inbelspreekuur

- telefoonnummer: 020 444 14 30 - iedere werkdag tussen 10.00 en 11.00 uur

Dagbehandeling MDL, locatie VUmc

- locatie: Receptie W
- telefoonnummer: 020 444 11 25

Specialistische Spoed Opvang (SSO), locatie VUmc - buiten kantoortijden

- telefoonnummer: 020 444 36 36

Tropencentrum, locatie AMC

- telefoonnummer: 020 566 38 00

Poliklinische Apotheek Amsterdam UMC, locatie AMC

- locatie: C0-123
- telefoonnummer: 020 566 36 77
- e-mailadres: amcapotheek@amc.nl

Poliklinische Apotheek Amsterdam UMC, locatie VUmc

- telefoonnummer: 020 444 27 77
- e-mailadres: apotheek.polikliniek@vumc.nl

Websites

- Algemeen IBD <https://ibd-amsterdamumc.nl/>
- Medicatiefolders <https://ibd-amsterdamumc.nl/behandeling/medicatie/>

Noteer hier uw vragen

