

## قسم أمراض النساء

## جراحة تدلي الرحم: إصلاح الجدار الخلفي

في هذا الكتيب، ستعرفين المزيد عن جراحة تدلي الرحم وإلحاقي بجناح H5-South (الجنوبي-H5)

## مقدمة.

قريباً، ستدخلين في Amsterdam UMC، موقع AMC في قسم أمراض النساء (H5-South) لعملية جراحة تدلي الرحم (جراحة الجدار الخلفي التجميلية). هذا الكتيب يهدف إلى إكمال المعلومات الشفهية التي يخبرها بك طبيبك. إذا كانت لديك أية أسئلة، من فضلك لا تتردد في الاتصال بالعيادة الخارجية أو قسم التمريض. نتمنى لك حظاً موفقاً وشفاء عاجل.

## ما هو إصلاح الجدار الخلفي؟

هذه العملية يتم اجرانها عند هبوط الجدار الخلفي للفرج /المهبل. طبيب النساء يجري هذه الجراحة عبر الفرج. يتم إعادة الجدار الخلفي الهابط للفرج مع الشرج الموجود خلفه، والذي أحياناً ما ترينـه منتفـاً كالكرة في فتحة الفرج إلى مكانه الصحيح. في منتصف الجدار الخلفي للفرج، طبيب النساء يفصل الجدار عن الشرج الموجود أسفله. يتم تقوية النسيج الضام بين جدار المهبل والشرج بخيوط جراحية. يمكن أن يستقر الشرج الأن على ذلك، ويختفي الهبوط. ثم يتم إزالة النسيج الزائد للمهبل. يتم خياطة جدار المهبل فوق النسيج الضام والشرج. بهذه الطريقة، يتم إرجاع المهبل إلى حيث يجب أن يكون، ويختفي الانتفاخ. يتم استخدام الخيوط الجراحية القابلة للذوبان أثناء الجراحة: لن يتم استخدام شاش /حشو. في نهاية الجراحة، سيضع الطبيب تامبون "سدادة قطنية" في المهبل، وقسطرة في المثانة.

## ما هي النتيجة؟

نسبة نجاح هذه العملية حوالي 80-90%. بعض النساء ستعانـي من تدلي الرحم في وقت قصير أو طويـل. التدلي الجديد لا يتسبـب في شكاوى دائمـاً، لذا لا يكون دائمـاً من الضروري إجراء عملية جراحـية جديدة. نصف النساء اللاتـي تعانـي من أعراض عدم القدرة على التبرـز بشكل صحيح أو اللاتـي تعانـي من الإمساك سيشعـرنـ بالتحسن بعد العمـلية.

## المضاعفات الممكن حدوثها

مع أي عملية، تكون المضاعفات جائزة. قد تحدث المضاعفات الشائعة التالية:

- التزيف
- التهاب بعد الجراحة (على سبيل المثال، التهاب المثانة). سيتم إعطاؤك مضادات حيوية عبر الوريد عادةً قبل الجراحة. في أثناء الجراحة، كل الجراحـات تتم على أقصى نظافة (تعقيم) ممـكـنـ. بالرغم من ذلك الاحتياـطـاتـ، هناك خطر ضئـيلـ لـلـالـتهـابـ حولـ المهـبـلـ أوـ الـحـوضـ. فيـ غـرـفـةـ الـعـمـلـيـاتـ، سـيـتـمـ إـطـعـاؤـكـ مـضـادـاتـ حـيـوـيـةـ عـبـرـ الـوـرـيدـ مـرـةـ وـاحـدةـ.
- ضـرـرـ فـيـ الأـمـعـاءـ
- إـمـسـاكـ
- سيتم معالجة أعراض الألم بالمسكنـاتـ. أعراض الألم المستمرـ، على سبيل المثال الألم خلال الجمـاعـ نـادـرـاًـ جداًـ.

وأخيراً، حتى بعد القيام بعملية ناجحة، أعراض تدلي الرحم قد تحدث مجدداً بعد سنوات. هذا يحدث لأن العملية لا تزيل سبب تدلي الرحم. للأسف، ليست هناك علاجات تمنع المشاكل من الحدوث مجدداً بشكل نهائي. إذا كنت تعتقدين أنه قد يكون لديك تدلي مستقيم جديد، فومي بمناقشته ذلك.

## التحضير للعيادة الخارجية

قبل إجراء الجراحة، ستقومين باستشارة عبر (الفيديو) واحدة على الأقل مع العيادة الخارجية لـ Amsterdam UMC، موقع AMC، لإجراء مقابلة مع الطبيب. وبعد ذلك، سيتم تحديد موعد مع قسم التخدير.

### العيادة الخارجية للتخيير

سيكون لديك موعد مع طبيب التخدير لمناقشة طريقة التسكين (تخدير أو تخدير فوق الجافية) خلال الجراحة. طبيب التخدير المتخصص في التخدير سيسألك أسئلة عن صحتك العامة، والجراحات السابقة، والأدوية، والامراض السابقة، وأي حساسية تجاه أدوية محددة، وتجاربك مع التخدير سابقاً. سيتم قياس ضغط الدم الخاص بك، وسيتم تحديد موعد لاختبارات إضافية.

### الترتيب

ستتلقين اتصالاً هاتفياً قبل أسبوع- أسبوعين من موعد الدخول المقرر.

## الاستعدادات لجناح التمريض

سيتم إدخالك إلى جناح التمريض H5-South سواء في اليوم الذي يسبق الجراحة، أو في يوم الجراحة. المدة الإجمالية للإقامة في المستشفى يوم-يومان في المتوسط.

### المقابلات والاختبارات في يوم الدخول

ستجرى عدة محادلات في يوم الدخول.

المرضية ستجري مقابلة حيث ستسألك عن تناولك للأدوية، بجانب أشياء أخرى. من المهم أن تجلبين كل أدوينك في غلافها/أغلقتها الأصلية عند دخولك. سيتم الطلب منك أن تقومي بترتيب أحدك لأدوينك الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم سؤالك عن أي حساسية، وحالتك الصحية العامة وحالة المنزل الخاصة بك. سيتم تسجيل اسم ورقم هاتف الشخص الذي يمكنك الاتصال به. هذا هو الشخص الذي سيتم الاتصال به بعد الجراحة لتأكيد أن العملية انتهت. يمكنك إعطائنا اسم زوجك، فرد في العائلة، أو صديق مقرب كشخص يمكننا الاتصال به. سيجري مساعد طبي استبيان طبي معك ويأخذ الدم. طبيب النساء و/أو مقيم سيزورك ليناقشك في الجراحة مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لديك فحص لأمراض النساء الداخلية آخر.

### مساء ما قبل العملية

في المساء الذي يسبق العملية، يمكنك أكل ما تريده حتى منتصف الليل.

في يوم الجراحة، لن يمكنك أكل أو شرب أي شيء في آخر 6 ساعات قبل العملية.

حتى 6 ساعات من قبل العملية، يمكنك أكل شيء خفيف كالبسكويت والبسكوتات الرقيقة.

حتى قبل ساعتين من العملية، يمكنك شرب السوائل الصافية.

ابق في عين الاعتبار أن موعد العملية الجراحية قد يتغير، لذا من الممكن أن تحتاجين إلى الوصول مبكراً.

### الجراحة

#### قبل العملية

• المرضية ستعطيك ملابس للجراحة. يجب إزالة المجوهرات، ثقب الجسم، مساحيق التجميل، وما فوق الرأس. إذا كنت ترتدين نظارات، عدسات لاصقة، أسنان مركبة، يجب إزالتهم قبل الدخول إلى غرفة العمليات.

- للاستعداد للتخدير، سيتم إعطاؤك دواء للعملية. طبيب التخدير سيحدد تلك الأدوية، والتي تتضمن مسكنات و/أو أقراص للاسترخاء/النوم.
- الممرضة ستأخذك أنت وسريرك إلى منطقة انتظار غرفة العمليات، غرفة الإفاقة. سيقوم خبير تخدير بالاعتناء بك مؤقتاً هنا.
- سيتم أخذك من غرفة الإفاقة من قبل طبيب التخدير ومساعده. ثم، سيكون فريق من الأطباء ومساعدي الجراحة بأخذك إلى الجراحة.

## خلال العملية

- في غرفة العمليات، يتم فحص أحدث إجراءات السلامة. سيطلب منك اسمك، وتاريخ ميلادك، وما لديك حساسية تجاهه، ومتى أكلت آخر مرة، وأخيراً، سيتم فحص سوار معصمك. سيتم أيضاً تأكيد الجراحة الخاصة بك.
- في غرفة العمليات، سيتم وضع كانيولا لك لإدخال السوائل والأدوية.
- أثناء الجراحة، ستلتقين تخديرًا فوق الجافية أو تخديرًا كليًا. إذا تلقيت تخديرًا كليًا، فستكونين فاقدة للوعي وستكونين متصلة بجهاز يفحص العلامات الحيوية. سيتم أيضًا إدخال أنبوب تنفس في حلقك للتنفس أثناء الجراحة. نتيجة لذلك، قد تشعرين بعدم الراحة في حلقك لعدة أيام. لا يتطلب فوق الجافية إدخال أنبوب في الحلق.

## بعد العملية

- بعد الجراحة، ستم إعادةك إلى غرفة الإفاقة. هنا ستبقين بعض من الوقت تحت الملاحظة. سيتم توصيلك بأجهزة ملاحظة، وإذا لزم الأمر، ستلتقين أكسجينًا إضافيًّا عبر أنبوب يصل إلى الأنف. يتم ترك شاش كبير في المهدب (سادة مهبلية). بالإضافة إلى ذلك، يتم إدخال قسطرة في المثانة لتصريف البول. هناك ممرضة متخصصة تعنى بك.
- ستتصل ممرضة النقاوة بأول شخص أعطيتنا رفقه للتواصل لإبلاغه بانتهاء العملية. لن يتم إبداء معلومات جوهرية.
- بمجرد أن تسمح حالتك البدنية، ستم إعادةك إلى H5-South.
- يمكنك عادة تناول الطعام مباشرة بعد الجراحة.

## أول يوم بعد العملية والخروج من المستشفى

من حيث المبدأ، من الممكن العودة إلى المنزل في اليوم الأول بعد الجراحة. ستم إزالة الكانيولا. بعد الجراحة، من المهم البدء في التحرك في أسرع وقت ممكن. سوف ترشدك الممرضة في ذلك. في صباح اليوم التالي للجراحة، ستم إزالة القسطرة والسدادة المهبلية. سيتم إجراء فحص روتيني لمعرفة ما إذا كنت تتبولين بشكل كافٍ. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتم تعليمك كيفية إفراغ المثانة بنفسك (القسطرة)، أو سيتم إعطاؤك قسطرة لأخذها إلى المنزل لبعض أيام أخرى. بعد هذه الجراحة، نادرًا ما تكون هناك حاجة إليها وتكون دائمًا عابرة.

## الخروج

عند الخروج من المستشفى، ستتجرين مقابلة مع طبيب الجناح. سيتم إعطاؤك خطاباً إلى طبيبك العام وأي وصفة (وصفات) للأدوية. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم لك الطبيب والممرضة تعليمات حول العيش ومتى يجب عليك الاتصال بالمستشفى.

## النقاوة

قد يستغرق التعافي من الجراحة 4-6 أسابيع.

سوف تلتقين نصائح من المستشفى حول مسكنات الآلام والملينات.

في الأسابيع الستة الأولى قواعد الحياة التالية لا يجب أن تتضمن على حمل الأشياء الثقيلة، ولا السباحة أو الاستحمام، ولا استخدام الساداتقطنية، ولا الجماع، بعد حوالي أربعة أسابيع، يمكنك البدء في ركوب الدرجات مرة أخرى، بشرط أن تسمح حالتك بذلك. قد يحدث التزيف المهبلي لمدة تصل إلى ستة أسابيع بعد الجراحة. يجب لا تستخدمي الساداتقطنية في هذا الوقت. سيقل فقدان الدم ببطء وغالباً ما يتحول إلى افرازات بنية أو صفراء. ستذوب أي غرز في الفرج من تلقاء نفسها. قد تخرج من تلقاء نفسها لأكثر من ستة أسابيع بعد الجراحة.

قد تكون القواعد التي تحصلين عليها من المستشفى مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه. إذا كان الأمر كذلك، يرجى الالتزام بالقواعد التي حصلت عليها من المستشفى.

طالما أنك لست في حالة جيدة ولا يمكنك رفع أشياء ثقيلة، فقد تكون المساعدة المنزلية مرغوبة. إذا لم يكن لديك شريك أو أطفال بالغون يعيشون في المنزل، فيمكنك القدم بطلب للحصول على هذا قبل العملية في مكتب قانون الدعم الاجتماعي. ومع ذلك، فإن هذا ينطوي على مدفوعات شخصية. بالطبع، يمكنك أيضاً ترتيب المساعدة المنزلية بنفسك.

سوف تتلقين نصائح من المستشفى حول المسكنات والملينات.

### **الغاية بالناهدين**

سيكون لديك موعد في العيادة الخارجية لأمراض النساء بعد 6 أسابيع من الجراحة.  
على أية حال، إذا كانت لديك أي أمراض، يمكنك دائمًا الاتصال بنا قبل ذلك.

### **متى عليكِ الاتصال بنا؟**

في حالة حدوث أحداث غير متوقعة في فترة ما بعد الجراحة، مثل الحمى، الألم الشديد، فقدان الدم بشكل كثيف، عدم المقدرة على التبول بشكل سليم، اتصل بقسم أمراض النساء الخاص بـ AMC، Amsterdam UMC، موقع 020-5663665 مبارة.

### **لشخص ذلك**

إذا كانت لديك أية أسئلة أو شكاوى، لا تتردد في الاتصال بطبيبك المعالج.

#### **Source**

IUGA, [www.iuga.org/patientinfo](http://www.iuga.org/patientinfo), and [www.NVOG.nl](http://www.NVOG.nl).