

Glomustumor (ORPHA 391651)

Wat is het?

Een glomustumor is een meestal goedaardige, vaak kleine wekedelentumor die ontstaat uit glomuscellen (cellen rond kleine bloedvaten). De tumor zit klassiek onder een nagel (subunguaal), maar kan ook elders in de weke delen voorkomen.

Klachten

Kenmerkende, soms hevige pijn bij aanraking of blootstelling aan kou. Soms een blauwachtige verkleuring onder de nagel. De klachten kunnen al jaren bestaan voordat de diagnose wordt gesteld.

Onderzoeken

De diagnose wordt vaak vermoed op basis van het verhaal en het lichamelijk onderzoek. Een MRI-scan of echografie helpt om de tumor zichtbaar te maken en te beoordelen. Meestal wordt de tumor in zijn geheel verwijderd en in het laboratorium onderzocht (weefselonderzoek). Een biopsie vooraf is meestal niet nodig.

Behandeling

Operatieve verwijdering (excisie), die bij complete verwijdering in principe curatief is.

Controles

Kortdurend (1 - 2 postoperatieve controles). Bij klachten of vermoeden op terugkeer wordt een nieuwe afspraak gemaakt, eventueel met aanvullend onderzoek zoals MRI-scan.