

Methylprednisolon bij een schub

Methylprednisolon is een ontstekingsremmende stof die erg lijkt op bijnierschors-hormoon. Dit middel wordt voorgeschreven om herstel van een schub te versnellen. Bij al langer bestaande klachten kan er een tijdelijke verbetering optreden. Het effect van de kuur kan per keer verschillen. Methylprednisolon heeft invloed op het afweersysteem. Daarom mag dit niet gegeven worden als men een onbehandelde infectie heeft.

Interactie met andere MS-medicijnen

In het algemeen heeft behandeling met methylprednisolon geen gevolgen voor de behandeling met andere medicijnen die voor MS gebruikt worden.

Toediening

Methylprednisolon kan als pil of per infuus worden gegeven.

Per pil: er wordt 1000 mg methylprednisolon per dag voorgeschreven gedurende drie dagen of 500 mg per dag gedurende vijf dagen. Elke capsule bevat 100 mg methylprednisolon.

Per infuus: in het algemeen wordt 1000 mg methylprednisolon per dag gedurende drie dagen voorgeschreven. Men krijgt elke dag een nieuw infuus waarbij gedurende twee uur de medicatie wordt toegediend. Wanneer de medicatie ingelopen is, wordt het naaldje verwijderd en kan men naar huis. In overleg kan men worden opgenomen in het ziekenhuis voor de kuur.

Bijwerkingen

Tijdens de kuur kan men last krijgen van de volgende bijwerkingen:

- een vieze smaak in de mond
- een opgejaagd gevoel
- slecht slapen
- een rood en/of opgeblazen hoofd
- hartkloppingen
- maagklachten

Deze bijwerkingen zijn tijdelijk.

Methylprednisolon kan een bloeddrukverhogend effect hebben.

Bij mensen die ook suikerziekte hebben is het van belang om tijdens en na het infuus de bloedsuikerwaarden extra te controleren. Er kan namelijk een ontregeling van de suikerziekte optreden.

Bijwerkingen zoals die gezien worden bij langdurig gebruik (bijvoorbeeld een opgezet gelaat of botontkalking) komen zelden voor bij korte kuren.

Effect

Sommige MS-patiënten merken al direct na het starten met de methylprednisolon vermindering van de klachten, bij anderen duurt dit enkele weken. Tot zes weken na de kuur kan de verbetering beginnen.

Verbetering die na die tijd begint, komt waarschijnlijk niet meer van de methylprednisolon, maar van het lichaam zelf.

Het kan ook zijn dat de kuur geen effect heeft op de klachten.

Na de kuur

Zes weken na de kuur heeft men een afspraak bij de neuroloog om de effecten van de behandeling te bespreken. De afspraak bij de neuroloog kan een consult in het ziekenhuis of een telefonische afspraak zijn. Zo nodig kan er ook eerder nog een afspraak met de MS-verpleegkundige worden gemaakt.

Dagbehandeling

De infusen worden gegeven op de dagbehandeling in de kliniek van Amsterdam UMC, locatie VUmc (gang 4 C).

De dagbehandeling is tijdens kantooruren bereikbaar tussen 13.00-16.00 uur via 020 444 07 07, ingeval van spoed is contact mogelijk voor 13.00 uur.

Het recept voor de prednisontabletten kan worden opgehaald bij de ziekenhuisapotheek op de polikliniek van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Meer MS-informatie

Voor actuele MS-informatie en nieuws over MS-onderzoek, kijk op de website:

www.mscentrumamsterdam.nl

U kunt zich inschrijven voor onze MS-nieuwsbrief via:

www.amsterdamumc.nl/mscentrumniewsbrief

Folders over MS zijn te downloaden via:

www.amsterdamumc.nl/msfolders

Steun MS-onderzoek

‘Wij willen mensen met MS een normaal dagelijks leven geven’ Wij kunnen niet zonder uw steun! Doneren kan via www.steunmscentrumamsterdam.nl.