

Lever: goedaardige aandoeningen

U vindt in de volgende tekst uitleg over goedaardige aandoeningen van de **lever**. U leest welke klachten er zijn, hoe onderzoek gaat en welke behandelingen mogelijk zijn.

Vetgedrukte woorden worden uitgelegd onderaan deze tekst.

Wat zijn goedaardige leveraandoeningen?

Goedaardige leveraandoeningen zijn afwijkingen in de **lever** die niet **kwaadaardig** zijn. Deze afwijkingen zijn meestal niet gevaarlijk.

Bij Amsterdam UMC zien we vooral:

- **Levercysten**
- **Focale nodulaire hyperplasie (FNH)**
- **Hemangioom**

Soms ontdekt een arts een afwijking bij toeval tijdens een **echo** of **scan** van de buik.

Levercysten

Wat zijn levercysten?

Een **cyste** in de lever is een met vocht gevulde holte. U kunt er één of meer hebben.

Klachten

De meeste mensen met een levercyste hebben geen klachten. Bij een grote cyste kan er druk of pijn rechtsboven in de buik komen. Heel soms bloedt of scheurt een cyste. U heeft dan plotseling meer pijn.

Onderzoek bij levercysten

Een arts ziet een **cyste** meestal bij een **echo**. Soms is extra onderzoek nodig om goed te kijken wat voor cyste het is.

Behandeling

- Heeft u geen klachten? Dan is een behandeling meestal niet nodig.
- Heeft u wel klachten? Dan kan de arts de **cyste** leegzuigen of soms met een operatie weghalen.

Polycysteuze leverziekte

Wat is polycysteuze leverziekte?

Bij deze zeldzame ziekte zitten er meer dan 20 **cysten** in de lever. Dit is vaak erfelijk.

Klachten

De lever wordt soms groot, waardoor u last krijgt van een vol gevoel, buikpijn of een dikkere buik.

Onderzoek en behandeling

De arts gebruikt meestal een **scan** of **echo** voor de diagnose. Behandeling is nodig als u klachten heeft. Soms wordt een grote **cyste** leeggehaald of verwijderd. Heel soms is een **levertransplantatie** nodig.

Focale Nodulaire Hyperplasie (FNH)

Wat is FNH?

FNH is een **goedaardige** knobbel van levercellen en galwegcellen. Dit is geen **kanker**.

Klachten

Meestal merkt u niet dat u FNH heeft. Bij een grote knobbel voelt u soms een vage pijn of druk rechtsboven in de buik.

Onderzoek en behandeling

FNH wordt vaak bij toeval ontdekt. Een **echo** of **scan** bevestigt meestal de diagnose. Soms is een extra prikje nodig om een stukje weefsel te onderzoeken. Behandeling is meestal niet nodig. Alleen als de knobbel groeit of klachten geeft volgt soms een operatie.

Hemangioom

Wat is een hemangioom?

Een **hemangioom** is een **goedaardige** zwelling van bloedvaten in de **lever**. Dit is de meest voorkomende leverknobbel.

Klachten

Bij kleine hemangiomen zijn er geen klachten. Alleen als het hemangioom groter wordt, kunt u pijn of een drukkend gevoel krijgen. Heel soms bloedt het.

Onderzoek

De arts vindt een hemangioom meestal bij een **echo**. Soms volgt extra onderzoek met een **scan**.

Behandeling

- Behandeling is meestal niet nodig.
- Alleen bij klachten of problemen denkt de arts aan een operatie.

Hoe nu verder?

De arts bespreekt altijd met u of er een behandeling nodig is. Vaak is alleen controle nodig. Krijgt u klachten of verandert er iets? Neem dan contact op met uw arts.

Deze informatie geeft algemene uitleg. Uw arts bespreekt de keuzes altijd met u.

Uitleg vetgedrukte woorden

1. **Lever:** orgaan dat bloed zuivert en helpt bij eten verteren.
2. **Goedaardig:** geen kanker, niet gevaarlijk.
3. **Kwaadaardig:** betekent dat het wel kanker kan zijn.
4. **Cyste:** een holte met vocht erin.
5. **Hemangioom:** zwelling van bloedvaten.
6. **Echo:** onderzoek met geluidsgolven om in het lichaam te kijken.
7. **Scan:** onderzoek, zoals een CT- of MRI-scan.
8. **Levertransplantatie:** operatie waarbij een zieke lever wordt vervangen door een gezonde lever.

Let op: Deze informatie is bedoeld als algemene voorlichting. Uw arts bespreekt altijd uw persoonlijke situatie met u.