

Tacrolimus na niertransplantatie

De merknamen van tacrolimus zijn Advagraft, Prograft en Envarsus.

Waarvoor gebruikt u tacrolimus?

Tacrolimus remt het afweersysteem. Het vermindert de kans dat uw lichaam uw nieuwe nier als 'vreemd' gaat zien en vermindert daardoor ook de kans op afstoting.

Hoe gebruikt u tacrolimus?

- Advagraft (figuur 1) gebruikt u eenmaal per dag, bij voorkeur in de ochtend.
- Envarsus (figuur 2) gebruikt u eenmaal per dag, bij voorkeur in de ochtend.
- Prograft (figuur 3) gebruikt u tweemaal per dag. Tussen de innames van Prograft moet ongeveer 12 uur zitten.

Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen?

- Trillen
- Hoofdpijn
- Moeite met slapen
- Diarree en misselijkheid
- Hogere bloeddruk
- Hogere bloedsuikerspiegel

Let op!

De dosering van de tacrolimus wordt bepaald op basis van bloedspiegels.

Wanneer u bloed gaat prikken; neem die dag de tacrolimus dan in na de bloedafname.

Heeft u vragen?

Op www.apotheek.nl kunt u meer informatie vinden over dit middel.

Komt u er niet uit, neem dan contact op met uw eigen apotheek of nefroloog. Dit kan online via 'Mijn Dossier' of via telefoonnummer: 020 566 7032



Fig 1. Capsules Advagraft



Fig 2. Tablet Envarsus



Fig 3. Capsules Prograft