

Longfunctie

Stoppen met medicatie voorafgaand aan inspanningsonderzoek bij kinderen

Jouw arts heeft een inspanningsonderzoek voor jou aangevraagd. Sommige medicijnen kunnen het onderzoek beïnvloeden. Daarom vragen wij jou om inname van het door jou gebruikte medicijn te stoppen volgens onderstaande lijst. Wanneer je toch een van deze geneesmiddelen hebt ingenomen, verzoeken wij jou telefonisch contact op te nemen met de afdeling longfunctie (telefoon: 020-444 4324 tussen 08:00 en 16:30 uur).

Ook als je nog vragen hebt over het al dan niet en op welk tijdstip stoppen van medicatie, kun je dit nummer bellen.

Inhalatie beta-mimetica kortwerkend**8 uur**

- ☐ Aerolin^R - salbutamol
- ☐ Aeromir^R - salbutamol
- ☐ Berotec^R - fenoterol
- ☐ Bricanyl^R - terbutaline
- ☐ Ventolin^R - salbutamol

Inhalatie beta-mimetica langwerkend**48 uur**

- ☐ Atimos^R - formoterol
- ☐ Foradil^R -formoterol
- ☐ Oxis^R - formoterol
- ☐ Plusvent^R - salmeterol
- ☐ Serevent^R - salmeterol

Inhalatie beta-mimetica langwerkend + inhalatie steroïd**48 uur**

- ☐ Seretide^R -salmeterol + fluticason
- ☐ Symbicort^R -formoterol + budesonide
- ☐ Foster^R - formoterol + beclometason
- ☐ Fostair^R - formoterol + beclometason
- ☐ Flutiform^R- formoterol + fluticason

Inhalatie anti-cholinergica (kortwerkend)**24 uur**

- ☐ Atrovent^R - ipratropium
- ☐ Berodual^R - fenoterol + ipratropium
- ☐ Combivent^R- salbutamol + ipratropium

☐ Ipramol^R - salbutamol + ipratropium

Inhalatie anti-cholinergica (langwerkend)

4 dagen

☐ Spiriva^R -tiotropium

Antileukotriënen

24 uur

☐ Singulair^R -montelukast

Cromoglycaat en verwante stoffen

☐ Allergocrom^R, Lomudal^R, Lomusol^R -cromoglicinezuur **8 uur**

☐ Tilade^R -nedocromil **48 uur**

Theophyllines

48 uur

☐ Euphylline^R, Theolair^R, Theolair retard^R -theophylline

Antihistaminica

48 uur

☐ Aeries^R - desloratadine

☐ Allerfre^R - loratadine

☐ Atarax - hydroxizyne

☐ cetirizine

☐ Claritine^R - loratadine

☐ desloratadine

☐ Fenistil^R - dimitindeen

☐ Kestine^R - ebastine

☐ levocetirizine

☐ loratadine

☐ Mebhydroline - napadisilaat

☐ Mircol^R - mequitazine

☐ Mizollen^R - mizolastine

☐ Neoclarityn^R - desloratadine

☐ Polaramine^R - dexchlorfeniramine

☐ Prometazine (zowel drank als tabletten)

☐ Reactine^R - cetirizine

☐ Semprex^R - acrivastine

☐ STP-free^R - fexofenadine

☐ Tavegil^R - clemastine

☐ Telfast^R - fexofenadine

☐ Tinset^R - oxatomide

☐ Triludan^R - terfenidine

☐ Xyzal^R - levocetirizine

☐ Zaditen^R - ketotifen

☐ Zyrtec^R - cetirizine

Inhalatie of orale steroïden**niet stoppen**

- ☐ Aerobec^R -beclometason
- ☐ Alvesco^R - ciclesonide
- ☐ Becotide^R, Becloforte^R -beclometason
- ☐ Celestone^R -betametason
- ☐ Dexamethasonum
- ☐ Flixotide^R -fluticason
- ☐ Prednison en Prednisolonum
- ☐ Pulmicort^R -budesonide
- ☐ Qvar^R -beclometason

Neusspray (corticosteroïden)**niet stoppen****Oogdruppels****niet stoppen**

Vóór het inspanningsonderzoek graag sportkleding en - schoenen meenemen en drie uur voor het onderzoek geen zware inspanning leveren.