

Kinder MDL

Keuzekaart darmonderzoek

Je bent opgenomen voor een darmonderzoek. Om je darmen goed te kunnen bekijken is het nodig dat je darmen leeg zijn. Daarom krijg je een vloeistof die je opdrinkt of die via een maagsonde in je lichaam komt. De vloeistof maakt je darmen leeg. Met deze keuzekaart kun je met je verpleegkundige de beide mogelijkheden bespreken en hierna een keuze maken.

BEHANDELMOGELIJKHEID	BIJ BEIDE KEUZES GELIJK	VLOEISTOF DRINKEN	VLOEISTOF VIA MAAGSONDE
Hoe werkt de behandeling?	Je krijgt de middag en de ochtend voor het onderzoek een drank. Die drank zorgt ervoor dat je gaat poepen om je darmen leeg te maken. Naast deze drank mag je alleen helder vloeibare, suikervrije dranken gebruiken.	De afgesproken hoeveelheid (2 tot 4 liter) ga je drinken. Je moet elke 15 min. een glas drinken totdat de totale hoeveelheid op is.	Je krijgt een maagsonde (= een dun slangetje) ingebracht via je neus naar je maag. De drank loopt via de maagsonde naar je maag en je darmen.
Wat kan ik verwachten?	De drank geeft je een vol gevoel en/of kramp in je buik en je kunt misselijk worden. Je moet vaak naar de WC om te poepen, tot je darmen leeg zijn. Uiteindelijk ga je water poepen.		
Doet de behandeling pijn?	Buikkrampp kan vervelend zijn.		- Inbrengen van de maagsonde kan vervelend voelen. - Je kunt de maagsonde voelen zitten.
Wat zijn de voordelen van de verschillende opties?		- Je krijgt geen maagsonde. - Je hebt meer bewegingsvrijheid.	- Je proeft niets van de drank. - Je hoeft niet veel te drinken.
Wat zijn de nadelen van de verschillende opties?		- De drank heeft een aparte smaak. - Het is een grote hoeveelheid om te drinken. - Als het niet lukt om zelf te drinken, moet je alsnog een maagsonde.	- Zolang de vloeistof door de maagsonde loopt, zit je vast aan een infuuspaal (daarmee kun je wel rondlopen) - De maagsonde zit in je neus van de middag voor het onderzoek tot de volgende ochtend.