

Antibiotica allergie

U krijgt informatie over allergie voor antibiotica en hoe u daarmee om kunt gaan. Deze tekst is gemaakt in samenwerking met AMR Zorgnet Holland West.



Antibiotica en bijwerkingen

Antibiotica worden gebruikt voor het behandelen of voorkomen van een infectie. Helaas kunnen antibiotica soms bijwerkingen geven. Deze klachten kunnen vervelend zijn, maar zijn vaak onschuldig. Voorbeelden van bijwerkingen door antibiotica zijn: misselijkheid, diarree en verandering van smaak.

Sommige mensen krijgen bij het gebruik van antibiotica last van een allergie. Bij een antibiotica-allergie reageert het lichaam met een afweerreactie tegen de antibiotica. Allergieën door antibiotica zijn zeldzaam. Ze komen veel minder vaak voor dan bijwerkingen.

Welke typen antibiotica-allergie zijn er?

We kunnen antibiotica-allergieën indelen in twee categorieën: acute reacties en vertraagde reacties.

Acute reacties

De reactie treedt snel op, meestal binnen een uur. Klachten die vaak voorkomen zijn galbulten en zwellingen. In ernstige gevallen daalt de bloeddruk en ontstaan er problemen met ademen. Dit wordt in medische termen 'anafylaxie' genoemd. Anafylaxie is gelukkig zeldzaam.

Vertraagde reacties

De reactie treedt later op, vaak pas na enkele dagen of weken. Een rode en jeukende huiduitslag is het bekendste voorbeeld. Vertraagde reacties zijn meestal niet gevaarlijk. Vaak kan het antibioticum nog veilig worden ingenomen. Ernstige reacties komen wel voor, maar zijn zeldzaam.

Hoe wordt onderzocht of ik een antibiotica-allergie heb?

Het is belangrijk om na te gaan of u een allergie heeft en welk type. Er kan dan bepaald worden of het veilig is om het antibioticum opnieuw te gebruiken. Bijwerkingen worden vaak onterecht

aangezien voor een allergie. Ook kan het zijn dat de klachten werden veroorzaakt door de infectie zelf, en niet door het antibioticum. Het is daarom belangrijk om te weten wat uw klachten precies waren.

Een allergie kan ook overgaan. Het kan zijn dat als u vroeger een allergie heeft gehad, u nu niet meer allergisch bent. Hoe langer de reactie geleden is, hoe groter de kans dat de allergie nu niet meer bestaat. Daarom is het ook belangrijk hoe lang geleden u de klachten u de klachten had.

Met wat u vertelt over uw klachten, kan meestal al besloten worden of u het antibioticum veilig kunt gebruiken in de toekomst. Extra onderzoek is vaak niet nodig. Soms zijn er huidtesten nodig om te bepalen of u (nog) allergisch bent. Deze huidtesten kunnen worden gedaan bij een allergoloog of dermatoloog.

Ik ben allergisch voor een antibioticum. Wat nu?

Als u allergisch bent voor een antibioticum, moet er bij een infectie meestal gekozen worden voor een ander antibioticum. Wat er wel en niet veilig gebruikt kan worden, hangt af van het type allergie en de ernst van de allergie. Het is daarom van belang dat al uw zorgverleners op de hoogte zijn van uw allergie

Ik blijf toch niet (meer) allergisch voor een antibioticum. Wat nu?

Veel mensen hebben in hun medisch dossier een allergie staan voor een antibioticum, terwijl dit niet (meer) het geval is. Van de 10 mensen die volgens hun dossier een allergie hebben, blijken er 9 niet allergisch te zijn. Hierdoor kan niet het beste antibioticum worden gekozen. Als u niet (meer) allergisch blijkt te zijn voor een antibioticum, kan een infectie beter behandeld worden. Het is daarom van belang dat al uw zorgverleners hiervan op de hoogte zijn.

Advies

- Heeft u een allergie? Geef uw allergie door aan al uw zorgverleners, zoals uw apotheek, huisarts en eventueel uw medisch specialist.
- Vermeld een ernstige allergie altijd in een medisch paspoort (ook in het Engels indien u reist) en in een SOS-hanger, als u deze heeft.
- Als gebleken is dat u niet (meer) allergisch bent, geef dit door aan al uw zorgverleners, zoals uw apotheek, huisarts en eventueel uw medisch specialist.

Bekijk het filmpje

Scan de QR-code en bekijk het filmpje over antibiotica-allergie.



AMR Zorgnet Holland West