

Thuis Totale Parentale Voeding (TPV) gebruiken

Wist u dat u voeding via de bloedbaan kunt krijgen als uw darmen niet goed werken? Dit heet 'Totale Parenterale Voeding' (TPV). Heeft u vragen over TPV? Lees dan verder om te ontdekken wat TPV is en hoe het werkt.

U vindt uitleg over de onderstreepte medische woorden onderaan deze tekst.

Wat is TPV?

TPV betekent dat voeding niet via de darmen, maar direct in het bloed gaat. Dit gebeurt via een dun slangetje, een katheter, dat in een groot bloedvat zit.

In TPV zitten alle voedingsstoffen die u nodig heeft. Uw lengte, gewicht, maar ook hoe actief u bent bepaalt hoeveel voeding u krijgt. Uw bloed en gewicht worden regelmatig gecontroleerd. Als dat nodig is wordt de TPV aangepast.

Hoe krijg je TPV binnen

TPV kan op 4 manieren worden toegediend. Dat kan via

- een 'Centraal veneuze katheter' (CVC)
- een 'Perifeer Ingebracht Centraal veneuze Catheter' (PICC)
- een 'Port-a-Cath' (PAC)
- een shunt.

U kunt met deze 4 toegangswegen douchen en zwemmen. Verder heeft elke manier zijn eigen voor- en nadelen. Bespreek met het TPV & Darmfalenteam welke methode het beste bij u past.

Thuiszorg

In de TPV-training leert u hoe u zelf de TPV aansluit op uw katheter.

Als dat niet lukt, kan een mantelzorger of een gespecialiseerd thuiszorgteam helpen.

Het TPV & Darmfalenteam regelt alles voor u voordat u naar huis gaat. Zij zorgen voor de training, de infuuspomp en hulpmiddelen.

Kosten

Uw zorgverzekering vergoedt de kosten voor TPV. Het TPV & Darmfalenteam helpt u met de aanvraag. Heeft uw zorgverzekeraar vragen? Dan kan die ook contact opnemen met het TPV & Darmfalenteam.

Contact en ondersteuning

Heeft u vragen of problemen? Neem contact op

TPV & Darmfalenteam Amsterdam UMC, locatie AMC

Meibergdreef 9 - 1105 AZ Amsterdam. Kamer: A3-338

- E-mail: tpvthuis@amc.uva.nl
- Telefoon: 020 - 566 51 20/020 - 566 91 11. Bereikbaar op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur.
- Bij spoed buiten kantooruren: neem contact op met de dienstdoende arts

Leverancier TPV & infuuspomp

Naam: firma Appo, Roosendaal

Telefoon: 085 902 38 80

E-mail: infuustherapie@appo.nl

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

Houttuinlaan 4b - 3447 GM Woerden

E-mail: info@crohn-colitis.nl

Telefoon: 0348 - 432 920

Bereikbaar van ma t/m do tussen 10.00 en 14.30 uur

Ervaringsdeskundigenlijn

Telefoon: 0348 - 420 780

Bereikbaar van ma t/m do tussen 10.00 en 12.30 uur



De vereniging heeft een werkgroep voor mensen met het short bowel syndrome. Deze werkgroep heeft een eigen website. Voor deelnemers is er ieder jaar een bijeenkomst.

Medische woorden in deze tekst

1. **Totale Parenterale Voeding (TPV):** voeding die direct in het bloed gaat.
2. **Centraal Veneuze Katheter (CVC):** een dun slangetje in een groot bloedvat in de borst.
3. **Perifeer Ingebracht Centraal veneuze Catheter (PICC):** een slangetje in de bovenarm.
4. **Port-a-Cath (PAC):** een aanprikpunt voor voeding onder de huid.
5. **Shunt:** een verbinding tussen een slagader en ader. Deze verbinding wordt speciaal gemaakt voor TPV-voeding.