

# Checklist behandeling PRRT

Een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de activiteiten rondom uw PRRT behandeling. U kunt deze zelf of samen met de verpleegkundig consulent of internist-oncoloog invullen.

## PRRT behandeling 1

**Datum:**

Activiteit	Datum	Bijzonderheden	√
Gesprek met nucleair geneeskundige over de behandeling.		Deze informatie heeft u nodig om u goed voor te bereiden op de behandeling. Leefregels na PRRT worden besproken.	
Stop lanreotide (Somatuline®).		6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt.	
Verpleegkundig consult spuitinstructie octreotide (Siroctid®).		Hierover krijgt u uitleg. Indien bij u van toepassing.	
Start octreotide (Siroctid®).		Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. 3 x daags 100mcg.	
Bezoek aan arts in ziekenhuis en bloedonderzoek.		Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn.	
Stopdatum (Siroctid®).		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing.	
Start PRRT behandeling.		De dag van de behandeling	

<b>Scan na PRRT.</b>		Deze scan wordt een dag na de PRRT behandeling gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen.	
<b>Herstart lanreotide (Somatuline®).</b>		U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Attentie: <b>niet</b> de Siroctid spuitjes!	
<b>Einde leefregels PRRT.</b>		Een week na de PRRT behandeling.	
<b>Telefonisch consult Verpleegkundig consulent.</b>		U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling.	
<b>Bezoek arts in het ziekenhuis.</b>		Controle na uw PRRT behandeling 6 weken na toediening.	

## PRRT behandeling 2

Datum:

Activiteit	Datum	Bijzonderheden	√
Bezoek arts in het ziekenhuis en bloed prikken.		Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn.	
Stop lanreotide (Somatuline®).		6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u weer stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt.	
Start octreotide (Siroctid®).		Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. Indien van toepassing.	
Stopdatum (Siroctid®).		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing.	
Start PRRT behandeling.		De dag van de behandeling.	
Scan na PRRT.		Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen.	
Herstart lanreotide (Somatuline®).		U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®).	
Einde leefregels PRRT.		Een week na de PRRT behandeling.	
Telefonisch consult Verpleegkundig consulent.		U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling.	
Bezoek arts in het ziekenhuis.		Controle na uw PRRT behandeling 4-6 weken na toediening.	
CT scan.		U krijgt voorafgaand aan de derde PRRT behandeling een CT scan.	

## PRRT behandeling 3

Datum:

Activiteit	Datum	Bijzonderheden	√
Bezoek arts in het ziekenhuis en bloedprikken.		Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn plus de uitslag van de CT scan besproken.	
Stop lanreotide (Somatuline®).		6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt.	
Start octreotide (Siroctid®).		Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. 3 x daags 100mcg indien bij u van toepassing.	
Stopdatum (Siroctid®)		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing.	
Start PRRT behandeling.		De dag van de behandeling.	
Scan na PRRT.		Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen.	
Herstart lanreotide (Somatuline®).		U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®).	
Einde leefregels PRRT.		Een week na de PRRT behandeling.	
Telefonisch consult Verpleegkundig consulent.		U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling.	
Bezoek arts in het ziekenhuis.		Controle na uw PRRT behandeling 4-6 weken na toediening.	

## PRRT behandeling 4

Datum:

Activiteit	Datum	Bijzonderheden	√
Bezoek arts in het ziekenhuis en bloed prikken.		Voorafgaand aan PRRT behandeling om te kijken hoe u zich voelt en of de labwaarden goed genoeg zijn.	
Stop lanreotide (Somatuline®).		6 weken voorafgaand aan PRRT behandeling moet u weer stoppen met de lanreotide (Somatuline®), indien u deze gebruikt.	
Start octreotide (Siroctid®).		Max. 2 weken voorafgaand aan PRRT behandeling. Indien van toepassing.	
Stopdatum (Siroctid®).		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing.	
Start PRRT behandeling.		De dag van de behandeling.	
Scan na PRRT.		Deze scan wordt gemaakt om te kunnen vaststellen of de radioactiviteit goed door de tumoren is opgenomen.	
Herstart lanreotide (Somatuline®).		U mag een dag na de PRRT behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®).	
Einde leefregels PRRT.		Een week na de PRRT behandeling.	
Telefonisch consult Verpleegkundig consulent.		U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT behandeling.	
CT scan.		U na uw laatste PRRT behandeling een CT scan.	
Bezoek arts in het ziekenhuis.		Controle na uw laatste PRRT behandeling, 4-6 weken na toediening. Ook worden vervolfspraken gemaakt.	

