

Vaccinaties bij patiënten met een hematologische aandoening

Door uw hematologische ziekte of behandeling hiervoor, heeft u mogelijk een minder goede afweer (immuniteit) tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek.

Op de vaccinatiepoli krijgt u advies over welke vaccinatie(s) u nodig heeft. Welke vaccinaties u precies krijgt hangt af van uw situatie (verderop in deze folder ziet u voorbeelden van vaccinatieschema's na bepaalde behandeling).

Hieronder ziet u de vaccinaties die u mogelijk kunt krijgen



Vaccinatie tegen longontsteking (pneumokokkenvaccinatie)



Vaccinatie tegen gordelroos (Shingrix)



Vaccinatie tegen COVID-19 (coronavirus)



Vaccinatie tegen de griep (influenza vaccinatie)



Vaccinatie tegen Bof, Mazelen, Rode Hond (BMR)

Meer informatie?

Voor meer informatie over vaccineren en vaccinaties bij patiënten met een minder goed werkend immuunsysteem kijk ook op:

- <https://www.hematon.nl/thema-s/behandelingen/vaccinaties>
- <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/derde-prik-voor-specifieke-groep-patiënten-met-ernstige-afweerstoornis>
- <https://www.vaccinatiesopmaat.nl/vaccinatie/vaccinaties-en-afweerstoornissen>

Gaat u op reis?


Als uw afweer minder goed is loopt u extra risico om ook ziek te worden op reis. Soms betekent dit dat we een reis naar bepaalde gebieden afraden. In sommige gevallen is het advies u (extra) te vaccineren. U kunt op de vaccinatiepoli overleggen wat in uw geval nodig is. U kunt ook kijken op reisprk.nl voor meer informatie.

Vaccinaties na allogene stamceltransplantatie

Door uw stamceltransplantatie en de bijbehorende chemotherapie heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek. U gaat hier onder andere de 'kindervaccinaties' opnieuw krijgen en aanvullende vaccinaties die u beschermen tegen infecties.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie polikliniek vanaf 3 maanden na uw allogene stamceltransplantatie.

Vaccinatieschema na allogene stamceltransplantatie




Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.

Vaccinaties na CAR T-celtherapie

Door uw CAR T-celtherapie en de bijbehorende chemotherapie heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) gedeeltelijk of geheel verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie polikliniek. U gaat hier onder andere de vaccinaties tegen longontsteking en gordelroos krijgen.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie polikliniek vanaf 3 maanden na uw CAR T-celtherapie.

Vaccinatieschema na CAR T-celtherapie



* Als u sneller dan 6 maanden na CAR T-celtherapie op de vaccinatie polikliniek komt. Dan wordt er gewacht met de pneumokokkenvaccinatie tot minimaal 6 maanden na CAR T-celtherapie.

^ Als u minder dan 3 maanden geleden COVID-19 heeft gehad, dan krijgt u geen COVID-19-vaccinatie. Deze mag pas na 3 maanden weer gegeven worden.


Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.

Vaccinaties na autologe stamceltransplantatie

Door uw autologe stamceltransplantatie (en de bijbehorende chemotherapie) heeft u uw afweer tegen virussen, bacteriën en andere ziekteverwekkers (immuniteit) gedeeltelijk of geheel verloren. Hierdoor loopt u een verhoogd risico op het krijgen van infecties, die ernstig kunnen verlopen. Daarom heeft uw hematoloog u verwezen naar de vaccinatie-polikliniek. U gaat hier onder andere de vaccinaties tegen longontsteking en gordelroos krijgen.

Hieronder ziet u het schema dat we u adviseren en zal worden aangeboden op de vaccinatie-polikliniek vanaf 3 maanden na stamceltransplantatie.

Vaccinatieschema na autologe stamceltransplantatie



* Als u minder dan 3 maanden geleden COVID-19 heeft gehad, dan krijgt u geen COVID-19 vaccinatie. Deze mag pas na 3 maanden weer gegeven worden.

Mocht u vragen hebben hierover, dan kan u die stellen op de vaccinatie polikliniek tijdens uw afspraak.