

Atypische cartilagineuze tumor (ACT)

Patiënteninformatie

Wat is het?

Een atypische cartilagineuze tumor (ACT) is een bottumor die uitgaat van kraakbeenvormende cellen in het bot. De tumor is intermediair (ook wel borderline): hij zit tussen goedaardig en kwaadaardig in. ACT is een van de meest voorkomende bottumoren en komt vooral voor in de lange pijpbeenderen, zoals het bovenbeen en de bovenarm, meestal bij mensen ouder dan 40 jaar. In de platte botten (zoals bekken of ribben) kan de tumor zich agressiever gedragen.

Klachten

Vaak geeft een ACT geen klachten en wordt hij bij toeval ontdekt. Soms is er pijn of een zwelling, afhankelijk van waar de tumor zit.

Onderzoeken

Er wordt een röntgenfoto en een MRI-scan van het aangedane bot gemaakt. Op indicatie wordt ook een CT-scan gemaakt.

Behandeling

Vaak is directe behandeling niet nodig en volstaat afwachtend beleid: de tumor wordt met röntgenfoto's en/of MRI gecontroleerd.

Controles

Controle vindt plaats na 1 en 3 jaar met röntgenfoto's en/of MRI. Op indicatie (bij verandering op beeldvorming of passende klachten) kan dit 1 of enkele jaren verlengt worden.