

Blaasspoelingen met Mitomycine

Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan alles verwijderd worden met één ingreep. Wel is er vaak nog een aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn. Zoals uw uroloog met u heeft besproken wordt u verder behandeld door middel van blaasspoelingen met Mitomycine (MMC)). MMC is een vorm van chemotherapie dat rechtstreeks in de blaas kan worden toegepast. Van deze behandeling is bewezen dat zij werkzaam is bij de behandeling van, en ter voorkoming van oppervlakkige blaastumoren. De behandeling bestaat uit in totaal 9 spoelingen: vier spoelingen 1 keer per week en vijf spoelingen 1 keer per maand. De spoelingen vinden poliklinisch plaats.

Vorbereiding

- Wij raden u aan om ongeveer 4 uur vóór de spoeling niet meer te drinken om de spoeling die wordt gegeven niet te verdunnen.
- Anderhalf uur ná het inbrengen van de spoeling mag u weer starten met drinken.
- U mag wel eten en gebruikelijke medicatie met water innemen. Gebruikt u plastabletten (diuretica), en heeft u een afspraak in de ochtend? Dan kunt u deze beter ná het uitplassen van de spoeling innemen.
- Als u heeft gemerkt dat u enige dagen vóór de spoeling bloed of bloedstolsels in de urine had of andere bijwerkingen/klachten is het belangrijk dit te bespreken.

De spoeling

Vóór het inbrengen van de spoeling wordt de uitwendige opening van de plasbuis schoongemaakt en wordt een dun slangetje, de katheter, via de plasbuis in de blaas gebracht. De blaas wordt zo eerst gelegegd. Vervolgens wordt via deze katheter de Mitomycine-oplossing in de lege blaas gebracht. Hierna wordt de katheter verwijderd. In principe mag u hierna gewoon naar huis. Het is de bedoeling dat u probeert de oplossing minimaal 1-en maximaal 2 uur in de blaas te houden.

Ná de spoeling

Tijdens de eerste twee dagen ná de spoeling:

- Ongeveer twee uur na de spoeling plast u zittend uit, dit voorkomt spatten. De kleur van de eerste plas is lichtpaars door de Mitomycine. Let er op dat de vloeistof niet onnodig in aanraking komt met de huid. U kunt de geslachtsdelen naspoelen met water.

- Hierna goed de handen wassen met water en zeep.
- Spoel het toilet twee keer door met een dichte deksel (indien beschikbaar).
Voor reiniging van het toilet en de bril gebruikt u een Allesreiniger (dit is een Ph neutraal schoonmaakmiddel).
- Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling uit heeft geplast extra drinkt om infectie te voorkomen.
- Wij raden u aan om tot twee dagen na de spoeling geen geslachtsgemeenschap te hebben tenzij u of uw partner een condoom gebruikt.
- Kleding en ondergoed mogen gewoon in de was.

Bijwerkingen

- Vaker aandrang om te plassen.
- Een pijnlijk of branderig gevoel in de plasbuis en of blaas.
- Moeite met het ophouden van de urine.
- Bloed- of weefseldeeltjes in de urine.
- Jeuk en huiduitslag.
- Vrijwel altijd verdwijnen deze verschijnselen de dag na de spoeling. Indien de klachten ernstig zijn kunnen deze worden behandeld met medicijnen.
- Er kan een rode verkleuring van uw huid optreden, meldt dit aan uw uroloog.
Er kan sprake zijn van een allergie. De uroloog bespreekt met u wat er dan gedaan moet worden.

DIRECT CONTACT OPNEMEN BIJ

- Meer dan 38,5 graden koorts.
- Rode verkleuring van de huid.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze tekst nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de uroloog of de verpleegkundige. U kunt ook bellen:

- Polikliniek Urologie, voor afspraken:
020 - 444 1103 tussen 08:00 en 16:00 uur.
- Polikliniek Urologie, voor medische vragen aan verpleegkundige:
020 - 444 1103 tussen 08:30 en 09:30 uur en 13:00-14:00 uur.
- Afdeling Eerste Hulp, voor spoed:
020 - 444 4444 (er wordt contact opgenomen met de uroloog die dienst heeft).

Website: www.allesoverurologie.nl/behandelingen/mitomycine-mmc-blaasspoeling