

Nazorgbrief na endoscopisch onderzoek met sedatie

Voor patiënten, familie en zorgverleners in de thuissituatie

Sedatie

U heeft sedatie/een roesje gekregen tijdens het onderzoek. Deze medicatie beïnvloedt uw reactievermogen. Houdt u daarom gedurende 24 uur rekening met het volgende:

- U kunt de rest van de dag vergeetachtig en slaperig zijn
- U mag alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis en mag **niet** zelfstandig aan het verkeer deelnemen
- Geen gevaarlijke machines bedienen
- Wij raden u aan deze dag geen belangrijke beslissingen te nemen en geen alcoholhoudende dranken te nuttigen

Complicaties

Complicaties kunnen tot 10 dagen na het onderzoek optreden. Krijgt u heftige pijn, een opgezet buik, koorts (temperatuur > 38,5 C), koude rilling, veel bloedverlies (meer dan een kopje vol) of andere klachten, neemt u dan contact op met de afdeling.

Maandag t/m vrijdag van 8:30-16:30 uur via Tel: 020-4441125 (polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten).

Buiten kantooruren kunt u bellen naar Tel: 020-4443636 (spoedeisende hulp) en vragen naar de dienstdoende MDL arts.

QR- code met de verwijzing naar Mijndossier

