

Een behandeling met durvalumab

In deze folder leest u informatie over een behandeling die bestaat uit immunotherapie. Hoe gaat zo iets in zijn werk? Wat gebeurt er met uw lichaam? Wat zijn de bijwerkingen en hoe kunt u daar het beste mee omgaan?

Waarom immunotherapie? (durvalumab)

Bij patiënten met stadium III NSCLC (niet-kleincellige longkanker) bestaat de behandeling in eerste instantie meestal uit een combinatie van chemotherapie en bestraling of een operatie. Het doel van de behandeling bij stadium 3 - niet-kleincellige longkanker is om de ziekte zo onder controle te houden, dat deze zich niet verder verspreidt buiten de longen.

Vaak, zoals bij u, wordt deze behandeling gevolgd door behandeling met een immunotherapie zoals durvalumab voor maximaal 1 jaar.

Immunotherapie werkt niet direct op de kankercellen, maar helpt uw immuunsysteem te versterken zodat de kankercellen kunnen worden uitgeschakeld.

Het wordt gebruikt voor de behandeling van een type longkanker met de naam niet-kleincellig (NSCLC). Het wordt gebruikt als bij u NSCLC:

- heeft gereageerd of is gestabiliseerd na eerste behandeling met chemotherapie en bestraling.
- u een longoperatie heeft gehad.

De behandeling met durvalumab

- Durvalumab wordt elke 4 weken via het infuus toegediend op de dagbehandeling, W 4^e-etage .
- De toediening van de durvalumab duurt 1,5 uur.
- Een uur voor de afspraak met de longarts, laat u bloed afnemen op poli P 1^e-etage.
- Daarna bespreekt de longarts met u (poli M 1^e-etage), hoe u zich voelt en beoordeelt de bloedwaarden. Hierna, of een dag later, gaat u naar de dagbehandeling voor de durvalumab.
- Responsbeoordeling (kijken of de tumor gereageerd heeft of stabiel is) heeft in eerste instantie plaats 8 - 12 weken na de start van de therapie, dit is afhankelijk van de behandeling die u hiervoor gehad heeft.
- Voor deze beoordeling wordt een CT-scan gemaakt. De arts beslist wanneer de volgende responsebeoordeling nodig is.
- De behandeling duurt in principe 1 jaar.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste patiënten hebben ofwel geen last van bijwerkingen of last van bijwerkingen die over het algemeen goed te behandelen zijn.

De meest voorkomende bijwerkingen van durvalumab zijn

- koorts
- longinfecties/hoesten
- huiduitslag en/of jeuk
- diarree
- spier-/gewrichtspijn
- vermoeidheid/gewichtstoename door minder actieve schildklierfunctie.

De meeste van deze bijwerkingen zijn mild en kunnen met gewone geneesmiddelen behandeld worden. Sommige klachten zijn alleen te beoordelen door bloedafname. Heeft u klachten neem dan contact op met uw casemanager of in de avond/'s nachts of weekend met de longafdeling.

• Overgevoeligheidsreacties

Overgevoeligheidsreacties kunnen (zeer zelden) optreden. Dit kan gebeuren tijdens of kort na het infuus, maar ook later als u weer thuis bent.

Als een reactie optreedt tijdens het infuus is het belangrijk dat u dit meldt aan de verpleegkundige. De reactie kan mogelijk behandeld worden door het infuus langzamer te laten lopen, tijdelijk te stoppen of door extra medicatietoediening - na overleg met een arts.

Vragen

Contactgegevens casemanagers Longoncologie

- Longoncologie - spreekuur:
maandag t/m vrijdag 8.00 - 9.00 uur
telefoonnummer 06 - 257 208 23
e-mail longoncologieinfo@vumc.nl
- Spoed:
overdag: telefoonnummer 020 - 444 11 20
weekend/avond/nacht: telefoonnummer 020 - 444 21 50