

## Longziekten

# Sedatie met propofol

## Behandelkamer Longziekten

Uw behandelend arts heeft u voor een onderzoek met sedatie met propofol afgesproken op de behandelkamer longziekten. Sedatie is het verlagen van het bewustzijn met medicijnen, die ervoor zorgen dat u in een soort 'slaap' komt. Het middel propofol verlaagt het bewustzijn, het werkt snel en is ook snel weer uitgewerkt. Na een half uur bent u meestal weer goed wakker.

De propofol zal gedurende de hele procedure continu toegediend worden, het is een goed stuurbaar medicament. Dit houdt in dat u de gehele procedure 'slaapt'. Als de procedure klaar is wordt de toediening beëindigd en wordt u wakker. Tevens zal er pijnstilling worden toegediend waardoor u geen pijn zult ervaren tijdens het onderzoek.

De sedatie wordt uitgevoerd door een sedatiespecialist. Dit is een anesthesiemedewerker die hiervoor speciaal is opgeleid en onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog werkt. In deze folder leest u wat u van propofol-sedatie kunt verwachten en waar u rekening mee dient te houden.

## Vorbereiding

Voor het onderzoek met propofol-sedatie wordt er telefonisch contact met u opgenomen door de anesthesioloog voor de pre-operatieve screening (POS).

Voor het onderzoek mag u tot 6 uur van tevoren eten en drinken, hierna moet u nuchter zijn. Medicatie neemt u zoals altijd in, behalve als uw arts anders met u heeft afgesproken.

## De werkwijze

Voor de start van het onderzoek krijgt u een infuusnaald ingebracht in een bloedvat in uw arm of hand om hierover de medicatie toe te dienen. Voordat u in slaap gaat wordt u aan de monitor aangesloten om zo het hartritme, bloeddruk en zuurstofgehalte te meten. U krijgt zuurstof toegediend via de neus. U blijft spontaan ademhalen en uw reflexen blijven intact, zoals bijvoorbeeld de slik- en braakreflex. Door de infuusnaald wordt het slaapmiddel (propofol) toegediend. Gedurende het onderzoek blijft u verbonden aan alle monitoring. Na afloop van het onderzoek wordt u op de brancard naar de uitslaapkamer gereden. Uw persoonlijke eigendommen krijgt u mee op de brancard. U verblijft op de

uitslaapkamer tot u weer goed wakker bent en niet misselijk bent, ongeveer 1 uur. Na overleg met de sedatiespecialist en de longarts wordt het infuus verwijderd, krijgt u eten en drinken en mag u de afdeling verlaten.

## **Bijzondere omstandigheden**

In sommige gevallen, bij slechte hart- en/of longfunctie en/of (hevige) verkoudheid kan de longarts en/of sedatiespecialist die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van het slaapmiddel vanwege het risico op complicaties.

## **Reanimatiebeleid**

Op de Behandelkamer Longziekten komt u voor onderzoek/behandeling, de kans op complicaties is gering. Wij willen u er echter op attenderen dat in principe alle patiënten gereanimeerd worden bij een complicatie tenzij de patiënt zelf uitdrukkelijk meldt bij de arts dat hij/zij niet gereanimeerd wil worden.

Bij klinische patiënten wordt het klinisch afgesproken reanimatiebeleid aangehouden.

## **Tot besluit**

Zorgt u ervoor dat u onder begeleiding naar het ziekenhuis komt. Na vertrek uit het ziekenhuis mag u gedurende 24 uur niet werken of aan het verkeer deelnemen.

Wanneer u ongerust blijft na het onderzoek of u heeft nog vragen, neem dan gerust contact op met de Behandelkamer Longziekten (020-4442884 of

[behandelkamer@amsterdamumc.nl](mailto:behandelkamer@amsterdamumc.nl) ) of de Poli Longziekten

voor de dienstdoende longarts (020-4440522). Indien noodzakelijk kunt u buiten kantoor tijden contact opnemen met de dienstdoende longarts door middel van de centrale meldkamer Amsterdam UMC locatie VUmc (telefoonnummer 020-4444444)