

Longfunctie

Stoppen met medicatie voorafgaand aan Histamineprovocatietest

Het onderzoek, dat uw arts voor u heeft aangevraagd, wordt beïnvloed door het gebruik van een aantal medicijnen. Wij vragen u daarom de inname van die medicijnen te stoppen, volgens de onderstaande lijst.

Heeft u toch een van deze medicijnen ingenomen? Neem dan contact met ons op

- afdeling Longfunctie - locatie VUMC
- telefoon 020 444 43 24 - bereikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur

Ook als u andere vragen heeft over wel/niet stoppen met een medicijn, of over het tijdstip van stoppen van medicatie, kunt u dit nummer bellen.

Medicatiestoplijst

Stop - 1 week van te voren

Alle Antihistaminica:

- Acrivastine (Semprex®)
- Cetirizine (Cetirizine, Prevalin Allerstop®, Reactine®, Zyrtec®)
- Chloorcyclizine/cinnarizine (Primatour®)
- Cinnarizine (Cinnarizine)
- Clemastine (Clemastine, Tavegyl®)
- Cyclizine (Cyclizine tablet, Cyclizine zetpil FNA)
- Desloratadine (Desloratadine, Aerius®, Neoclarityn®)
- Dexchlorfeniramine (Polaramine®)
- Dimetindene (Fenistil®)
- Doxylamine/pyridoxine (Xonvea®)
- Ebastine (Ebastine, Kestine®)
- Fexofenadine (Fexofenadine, Allegra fexotabs®, Telfast®, STP.Free®)
- Hydroxyzine (Hydroxyzine, Atarax®)
- Ketotifen (Ketotifen stroop, Zaditen®)
- Levocetirizine (Levocetirizine, Xyzal®)
- Loratadine (Loratadine, Allerfre®, Claritine®)
- Meclizine (Suprimal®)
- Meclozine/pyridoxine (Emesafene®)
- Mebhydroline (Incidal®)
- Mizolastine (Mizollen®)

- Oxatomide (Tinset®)
- Oxomemazine (Toplexil®)
- Promethazine (Promethazine tablet, Promethazine stroop, Phenergan®)
- Rupatadine (Rupatadine, Rupafin®)
- Terfenadine (Triludan®)

Stop - 4 dagen voorafgaand

- Anoro® - vilanterol en umeclidinium
- Onbre® - indacaterol
- Relvar® - fluticasonfuroaat + vilanterol
- Seebri®- glycopyrronium bromide
- Spiriva® - tiotropium
- Striverdi® - olodaterol
- Tiotrus® - tiotropium
- Trelegy Ellipta® - fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol
- Trimbow® - beclometason/formoterol/glycopyrronium
- Ultibro Breezhaler® - indacaterol en glycopyrronium bromide

Stop - 48 uur voorafgaand

- Atimos® - formoterol
- Duaklir Genuair® - formoterol + aclidinium
- Euphylline®, TheolairR®, Theolair retardR® - theophylline
- Foradil® - formoterol
- Fostair® - formoterol + beclometason
- Foster® - formoterol + beclometason
- Flutiform® - formoterol + fluticason
- Oxis® - formoterol
- Plusvent® - salmeterol
- Prometazine (zowel drank als tabletten)
- Seretide® - salmeterol + fluticason
- Serevent® - salmeterol
- Spiolto® - tiotropium + olodaterol
- Symbicort® - formoterol + budesonide
- Tilade® - nedocromil

Stop - 24 uur voorafgaand

- Aerolin® - salbutamol
- Aeromir® - salbutamol
- Allergocrom®, Lomudal®, Lomusol® - cromoglicinezuur
- Atrovent® - ipratropium
- Berodual® - fenoterol + ipratropium
- Berotec® - fenoterol
- Bricanyl® - terbutaline
- Combivent® - salbutamol + ipratropium
- Eklira Genuair® - aclidinium
- Ipramol® - salbutamol + ipratropium

- Singulair® - montelukast 8 uur voorafgaand
- Ventolin® - salbutamol

Niet stoppen

- Aerobec® - beclometason
- Alvesco - ciclesonide
- Becotide®, Becloforte® - beclometason
- Celestone® - betametason
- Dexamethasonum
- Flixotide® - fluticason
- Prednison, prednisolonum
- Pulmicort® - budesonide
- Qvar® - beclometason