

Injectie met corticosteroiden in het middenoor

Wat is het doel van de behandeling?

Bij u is gebleken dat een conservatieve behandeling met afwachten en/of medicatie onvoldoende was om uw klachten van duizeligheid onder controle te krijgen. Een injectie met zogenaamde corticosteroiden (ontstekingsremmers) heeft als doel om de frequentie en de ernst van de aanvallen te doen verminderen. Daarnaast is er een kans dat de medicijnen een gunstig effect zullen hebben op het gehoor.

Wat houdt de behandeling in?

Voor de behandeling krijgt u een afspraak op de polikliniek KNO. Nadat de procedure nogmaals met u is doorgenomen zal uw oor eerst plaatselijk verdoofd worden. Nadat deze verdoving is ingewerkt wordt er met een dunne naald een klein gaatje in uw trommelvees geprikt waardoor het medicijn in uw middenoor worden gespoten.

Dit inspuiten kan tijdelijk gevoelig zijn en u kunt er ook tijdelijk wat duizelig van worden. Na het inspuiten dient u circa 10 minuten te blijven zitten of liggen en is het belangrijk dat u probeert om niet te slikken. Zo wordt voorkomen dat het medicijn wegvloeit via de buis van Eustachius in uw keel en niet voldoende binnendringt in het evenwichtsorgaan. Doorslikken van het medicijn heeft verder geen nadelige gevolgen.

Na de wachttijd wordt een nieuwe afspraak gemaakt en kunt u naar huis gaan. In principe groeit het gaatje in uw trommelvees binnen 1 à 2 dagen weer dicht.

Wat zijn de risico's van de behandeling?

De ingreep heeft weinig risico's. De corticosteroiden geven geen schade aan gehoor of evenwichtsorgaan. Bij 2 op de 100 patiënten (2%) groeit het gaatje in het trommelvees niet spontaan dicht. Dit geeft in de meeste gevallen geen problemen maar bij sommige mensen is het op een later moment nodig om met een kleine operatie het gaatje in het trommelvees te sluiten.

Wat is de prognose nadat ik een dergelijke injectie heb gekregen?

Er is een kans van ongeveer 70 op de 100 patiënten (70%) dat u een duidelijke afname in frequentie en ernst van de aanvallen merkt. Daarnaast is er een kans dat u een gunstig effect bemerkt op het gehoor; dit treedt op bij ongeveer 35 op de 100 patiënten (35%). Het effect van de injectie houdt ongeveer 6 maanden aan. Afhankelijk van uw klachten is het daarna mogelijk om de injectie te herhalen.