

Checklist behandeling PRRT

U wordt behandeld met peptide Receptor Radionuclide Therapie (PRRT). In deze folder vindt u een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de activiteiten rondom uw PRRT-behandeling. U kunt dit schema zelf invullen, of samen met uw verpleegkundig specialist of internist-oncoloog. Het schema herhaalt zich voor en na elke PRRT-behandeling.

PRRT-behandeling 1

ACTIVITEIT	DATUM	BIJZONDERHEDEN
Gesprek met nucleair geneeskundige over de behandeling	Afspraak volgt in uw MijnDossier	Deze informatie heeft u nodig om u goed voor te bereiden op de behandeling. Leefregels na PRRT worden besproken.
Stop lanreotide (Somatuline®)		6 weken voorafgaand aan datum van PRRT mag u geen lanreotide (Somatuline®) meer gebruiken, indien u deze gebruikt. Herstart hiervan mag na elke PRRT-toediening.
Start octreotide (Siroctid®)		2 weken voorafgaand aan PRRT-behandeling start u met kortwerkende lanreotide, max.3x daags 100mcg. Indien bij u van toepassing kunt u deze injecties zelf toedienen.
Stopdatum octreotide (Siroctid®)		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT-behandeling moet u stoppen met de Siroctid-injecties. Indien bij u van toepassing.

Start PRRT-behandeling.		De dag van de behandeling in het Amsterdam UMC, locatie VUmc op afdeling 3B.
Herstart lanreotide (Somatuline®)		U mag een dag na de PRRT-behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Indien bij u van toepassing.
Einde leefregels PRRT		Een week na de PRRT-behandeling.
Telefonisch consult verpleegkundig specialist		U krijgt een telefonische afspraak 1 - 2 weken na de PRRT-behandeling. ○ We bespreken dan ook de afspraken voor de volgende toediening.
Bezoek arts in het ziekenhuis	Afspraak volgt in uw MijnDossier	Bloedonderzoek en controle in het ziekenhuis na uw PRRT-behandeling 5 weken na toediening.

PRRT-behandeling 2

ACTIVITEIT	DATUM	BIJZONDERHEDEN
Stop lanreotide (Somatuline®)		6 weken voorafgaand aan datum van PRRT mag u geen lanreotide (Somatuline®) meer gebruiken, indien u deze gebruikt. Herstart hiervan mag weer na elke PRRT-toediening.
Start octreotide (Siroctid®)		2 weken voorafgaand aan PRRT-behandeling start u met kortwerkende lanreotide max.3x daags 100mcg. Deze injecties kunt u zelf toedienen. Indien bij u van toepassing.
Stopdatum octreotide (Siroctid®)		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT-behandeling moet u stoppen met de Siroctid-injecties. Indien bij u van toepassing.
Start PRRT-behandeling		De dag van de behandeling in het Amsterdam UMC, locatie VUmc op afdeling 3B.
Herstart lanreotide (Somatuline®)		U mag een dag na de PRRT-behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Indien bij u van toepassing.
Einde leefregels PRRT		Een week na de PRRT-behandeling.
Telefonisch consult verpleegkundig specialist	Afspraak volgt in uw MijnDossier	U krijgt een telefonische afspraak 1 - 2 weken na de PRRT-behandeling. We bespreken dan ook de afspraken voor de volgende toediening.
Bezoek arts in het ziekenhuis	Afspraak volgt in uw MijnDossier	Bloedonderzoek en controle in het ziekenhuis na uw PRRT-behandeling 5 weken na toediening.

PRRT-behandeling 3

ACTIVITEIT	DATUM	BIJZONDERHEDEN
Stop lanreotide (Somatuline®)		6 weken voorafgaand aan datum van PRRT mag u geen lanreotide (Somatuline®) meer gebruiken, indien u deze gebruikt. Herstart hiervan mag weer na elke PRRT-toediening.
Start octreotide (Siroctid®)		2 weken voorafgaand aan PRRT-behandeling start u met kortwerkende lanreotide max.3x daags 100mcg. Deze injecties kunt u zelf toedienen. Indien bij u van toepassing.
Stopdatum octreotide (Siroctid®)		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT-behandeling moet u stoppen met de Siroctid injecties. Indien bij u van toepassing.
Start PRRT behandeling		De dag van de behandeling in het Amsterdam UMC, locatie VUmc op afdeling 3B.
Herstart lanreotide (Somatuline®)		U mag een dag na de PRRT-behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Indien bij u van toepassing.
Einde leefregels PRRT.		Een week na de PRRT-behandeling.
Telefonisch consult verpleegkundig specialist	Afspraak volgt in uw MijnDossier	U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT-behandeling. We bespreken dan ook de afspraken voor de volgende toediening.
Bezoek arts in het ziekenhuis	Afspraak volgt in uw MijnDossier	Bloedonderzoek en controle in het ziekenhuis na uw PRRT-behandeling 5 weken na toediening.

PRRT-behandeling 4

ACTIVITEIT	DATUM	BIJZONDERHEDEN
Stop lanreotide (Somatuline®)		6 weken voorafgaand aan datum van PRRT mag u geen lanreotide (Somatuline®) meer gebruiken, indien u deze gebruikt. Herstart hiervan mag weer na elke PRRT-toediening.
Start octreotide (Siroctid®)		2 weken voorafgaand aan PRRT-behandeling start u met kortwerkende lanreotide max.3x daags 100mcg. Deze injecties kunt u zelf toedienen. Indien bij u van toepassing.
Stopdatum octreotide (Siroctid®)		Op de avond voorafgaand aan uw PRRT-behandeling moet u stoppen met de Siroctid-injecties. Indien bij u van toepassing.
Start PRRT behandeling		De dag van de behandeling in het Amsterdam UMC, locatie VUMC op afdeling 3B.
Herstart lanreotide (Somatuline®)		U mag een dag na de PRRT-behandeling weer herstarten met de lanreotide (Somatuline®). Indien bij u van toepassing.
Einde leefregels PRRT.		Een week na de PRRT-behandeling.
Telefonisch consult verpleegkundig specialist	Afspraak volgt in uw MijnDossier	U krijgt een telefonische afspraak 1-2 weken na de PRRT-behandeling.
Bezoek arts in het ziekenhuis	Afspraak volgt in uw MijnDossier	Bloedonderzoek en controle in het ziekenhuis na uw PRRT-behandeling 5 weken na toediening.
Einde PRRT-traject	Afspraak volgt in uw MijnDossier	12 weken na uw laatste PRRT-behandeling krijgt u een CT-scan om te beoordelen wat het effect van de PRRT is. U krijgt een controleafspraak in het ziekenhuis om de uitslag te bespreken en u moet bloed prikken.